


VEDLEGG 1 Biologisk mangfold i influensområdet: Vålas utløp – Vinkeldammen

Data fra Artskart/Artsdatabanken

Kartene nedenfor viser artsobservasjoner i og langs Våla, fra utløp og til og med Vinkeldammen. Observasjonene i og < 30 m fra vassdraget er listet opp til høyre for kartet, med rødlistestatus i parentes.



- Blåmeis (LC, livskraftig)
- Bergfrue (LC)
- Bustkrypmose (LC)
- Trinnbekkemose (LC)
- Rødfotmose (LC)
- Gyalecta jenensis (lav) (LC)
- Buttbustehette (mose) (LC)
- Skvallerkål (LC)
- Potamophylax cingulatus (insekt) (LC)
- Fossefall (LC)
- Ørret (LC)
- Myrrikse (EN, sterkt truet)
- Sprikepiggrø (EN)
- Mompha sturnipennella (sommerfugl) (LC)
- Trefingerurt (LC)
- Vanlig smådøgnflue (LC)
- Stokkand (LC)



- Dalfiol (VU, sårbar)
- Svoelriske (LC)
- Dvergsnelle (LC)
- Fiolstein (LC)
- Moskusurt (LC)
- Huldregras (lav) (NT, nær truet)
- Huldrenål (lav) (EN)
- Bever (LC)
- Krikkand (LC)
- Trådragg (VU)
- Hengepiggrø (NT)
- Bergfrue (LC)
- Kråke (LC)