

KONSESJONSSØKNAD FOR

Midtre Vikdal kraftverk

Vefsn kommune, Nordland Fylke



Fjellkraft
– et selskap i Nordkraft-konsernet



Fjellkraft AS

19. juni 2011

NVE-Konsesjons- og tilsynsavdelingen
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

SØKNAD OM KONSESJON FOR UTBYGGING AV MIDTRE VIKDAL KRAFTVERK.

Fjellkraft AS ønsker å utnytte vannfallet i Vikdalselva i Vefsn kommune i Nordland fylke, og søker herved om følgende tillatelser:

1. Etter vannressursloven, jf. § 8, om tillatelse til

- Å bygge Midtre Vikdal Kraftverk som beskrevet i søknaden

2. Etter energiloven om tillatelse til:

- Bygging og drift av Midtre Vikdal Kraftverk, med tilhørende koblingsanlegg og kraftlinjer som beskrevet i søknaden.

Alle andre nødvendige opplysninger om tiltaket fremgår av vedlagte utredning. Vi ber om snarlig behandling av søknaden.

Med vennlig hilsen
Fjellkraft AS



Torbjørn Sneve
Prosjektsjef småkraft

Midtre Vikdal Kraftverk

Søknad om konsesjon

Utarbeidet av Multiconsult AS



SAMMENDRAG

Midtre Vikdal Kraftverk vil utnytte vannføringen fra et felt på 31 km² i Vikdalselva i Vefsn kommune. Kraftverket vil utnytte et fall på 77 m mellom kote 179 og kote 102 i Vikdalselva. Installert effekt blir 3,0 MW. Midtre Vikdal Kraftverk er beregnet til å produsere 9,1 GWh i et midlere år. Med en utbyggingskostnad på 22,4 mill. kr. gir dette en utbyggingspris på 2,46 kr/kWh. Kraftverket er planlagt med et slipp av 411 l/s minstevann på sommeren og 37 l/s på vinteren, dette tilsvarer 5 % lavvannføring ved inntaket.

Utbyggingen er planlagt med en liten betongdam og inntakskonstruksjon i betong, vannveien vil være ca 710 meter nedgravd rørgate / rørgate klamret til fjell, i øvre deler av rørtraséen vil det måtte sprenges grøft. I det midtre partiet er rørgata tenkt klamret fast til fjell da dette er et svært bratt område. Et enkelt kraftstasjonsbygg er tenkt plassert nedenfor Forsskolten.

Naturtyper med fuktkrevende vegetasjon er registrert i influensområdet. Anleggsarbeid i forbindelse med framføring av rørgate vil medføre inngrep i bratt og rasutsatt terreng, og trolig forstyrre den naturlige vegetasjonen på bergflater og i urer med permanent virkning. Fossesprøytonen er avgrenset med nasjonal verdi (A). Den truede vegetasjonstypen fosse-eng (VU) inngår. Grantrær ved lokaliteten har en fuktkrevende epifyttflora, samfunn som har smal økologisk nisje og dermed er svært sårbar overfor endrede fysiske og klimatiske forhold. Ingen rødlistede arter ble påvist, men det er potensial for slike. Redusert vannføring og økt solinnstråling ved hogst av rørgatetrasé vil medføre at de mest fuktighetskrevede artene forsvinner. Konsekvensene for biologisk mangfold og verneinteresser og flora og fauna vurderes som **middels til stor negativ** (--/---). Minstevannføring er et viktig avbøtende tiltak.

Vikdalselva er ikke anadrom innenfor influensområdet, men det finnes bekkørret. Redusert vannføring kan gi redusert bunndyrproduksjon og endret artssammensetning. Konsekvensen vurderes som **liten negativ** (-).

Landskapsmessig vil tiltaket få en **liten negativ (-)** konsekvens. Rørgaten anlegges delvis i bratt og ulendt terreng, og sprengning vil medføre permanente sår. Elva har flere stryk og en større foss innenfor planområdet. Synligheten i landskapet er imidlertid liten på grunn av vegetasjon og topografi. Med tanke på friluftsliv vil tiltaket trolig ha **ubetydelig til liten negativ konsekvens(0/-)** ettersom store deler av influensområdet er bratt, utilgjengelig og lite synlig i landskapet.

Influensområdet er sommerbeite og tidvis vårbeite for Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. Trekkruiter går opp igjennom Vikdalen. Tiltaket vil medføre et midlertidig tap og et begrenset permanent tap av beiteområde, samt at støy fra anleggsarbeid og kraftstasjon kan gjøre at reinen skyr området. Konsekvensen vurderes som **liten negativ** (-).

For samiske interesser, kulturminner og kulturlandskap vurderes utbyggingen å medføre **ubetydelig konsekvens (0)**. For samfunnsmessige interesser og landbruk vurderes konsekvensen som **liten positiv** (+).

INNHold

SAMMENDRAG	III
1 INNLEDNING	1
1.1 Om søkeren.....	1
1.2 Begrunnelse for tiltaket.....	1
1.3 Geografisk plassering av tiltaket	1
1.4 Dagens situasjon og eksisterende inngrep.	1
1.5 Sammenligning med nærliggende vassdrag	1
2 BESKRIVELSE AV TILTAKET	2
2.1 Hoveddata	2
2.2 Teknisk plan for det søkte alternativ	3
2.2.1 Hydrologi og tilsig	3
2.2.2 Dam og inntak.....	3
2.2.3 Vannvei	4
2.2.4 Kraftstasjonen	4
2.2.5 Veibygging	5
2.2.6 Kraftlinjer	5
2.2.7 Massetak, deponi og rigg.....	5
2.2.8 Kjøremønster og drift av kraftverket.....	6
2.3 Kostnadsoverslag	6
2.4 Fordeler og ulemper ved tiltaket.....	6
2.4.1 Kraftproduksjon.....	6
2.4.2 Prosjektøkonomi	6
2.4.3 Kommuneøkonomi.....	7
2.4.4 Ulemper	7
2.5 Arealbruk, eiendomsforhold og offentlige planer	7
2.5.1 Arealbruk	7
2.5.2 Eiendomsforhold	7
2.5.3 Samlet plan for vassdrag	7
2.5.4 Verneplaner, kommuneplaner og andre offentlige planer	7
2.6 Alternative utbyggingsløsninger	7
3 VIRKNING FOR MILJØ, NATURRESSURSER OG SAMFUNN.....	9
3.1 Metode.....	9
3.1.1 Datagrunnlag	9
3.1.2 Prosedyre.....	9
3.2 Områdebeskrivelse	10
3.2.1 Geologi og landskap	10
3.2.2 Klima	10
3.2.3 Avgrensning av tiltaks- og influensområdet	10
3.2.4 Hydrologi.....	12
3.2.5 Vanntemperatur, isforhold og lokalklima.....	12
3.2.6 Grunnvann, flom og erosjon.....	12
3.2.7 Flora og Fauna	12
3.2.8 Biologisk mangfold og verneinteresser	13
3.2.9 Fisk og ferskvannsbiologi	17
3.2.10 Landskap	17
3.2.11 Kulturminner og kulturlandskap	19
3.2.12 Landbruk	20
3.2.13 Vannkvalitet, vannforsynings- og resipientinteresser.....	20
3.2.14 Brukerinteresser/friluftsliv	21
3.2.15 Reindriftsinteresser	22
3.2.16 Samiske interesser	22
3.2.17 Samfunnsmessige virkninger	23
3.2.18 Konsekvenser av kraftlinjer	23
3.2.19 Konsekvenser ved brudd på dam og trykkrør	23
3.2.20 Konsekvenser av alternative utbyggingsløsninger.....	24
3.3 Samlet konsekvensvurdering	24
3.3.1 Midtre Vikdal kraftverk	24
3.3.2 Sumvirkninger av tre småkraftverk i Vikdalselva	25

3.4	Avbøtende tiltak.....	28
3.4.1	Minstevannføring	28
3.4.2	Anleggstekniske innretninger.....	29
3.4.3	Vegetasjonsetablering og landskapspleie	30
3.4.4	Avfall og forurensning	30
4	OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER/OVERVÅKNING	31
5	REFERANSER OG GRUNNLAGSDATA	31

VEDLEGG

VEDLEGG 1: Oversiktskart med plassering av tiltaket

VEDLEGG 2: Oversiktskart med nedbørfelt

VEDLEGG 3: Planskisse av kraftverket

VEDLEGG 4: Hydrologi

VEDLEGG 5: Foto fra området

VEDLEGG 6: BM-rapport

1 INNLEDNING

1.1 Om søkeren

Fjellkraft AS er et investeringsselskap med fokus rettet mot småskala vannkraftverk.

Fjellkraft AS har inngått avtale med grunn- og fallrettseierne langs Vikdalselva i Vefsn kommune for utvikling av vannkraftressursene i vassdraget.

Søkers adresse:

Tullins gate 2, 0166 Oslo • Postboks 7033, St. Olavs Plass, 0130 Oslo

Kontaktperson: Torbjørn Sneve • Mobil: 97 70 16 20 • e-post: torbjorn.sneve@nordkraft.no

1.2 Begrunnelse for tiltaket

Hovedmålsetningen for grunneiernes samarbeid med Fjellkraft AS er å styrke næringsgrunnlaget på eiendommene og å utnytte den tilgjengelige ressursen i Vikdalselva bedre enn i dag. Tiltaket er ikke tidligere vurdert etter vannressursloven.

1.3 Geografisk plassering av tiltaket

Vikdalselva ligger i Vefsn kommune i Nordland ca 8 km vest for Mosjøen. Vassdragsnummer i Regine er 151.2Z. Det går ferge fra Mosjøen til Vikdalen og videre ut fjorden.

Kart med beliggenhet er vist i vedlegg 1. Vedlegg 2 og 3 viser oversiktskart over feltet og detaljkart.

1.4 Dagens situasjon og eksisterende inngrep.

Det aktuelle utbyggingsområdet brukes i dag til skogsdrift og utmarksbeite. Det går en skogsvei forbi utbyggingsområdet. Bortsett fra skogsveien er utbyggingsområdet er uberørt av tekniske inngrep.

1.5 Sammenligning med nærliggende vassdrag

Vikdalselva er landskapsmessig et forholdsvis typisk vassdrag for dette området. Området rundt utbyggingsområdet er berørt av kraftutbygging, blant annet er Hundålvatnet som ligger ca 5 km vest for Vikdalen regulert.

De spesielle miljøbetingelsene som oppstår i forbindelse med større fossefall i skogområder slik som de man finner innenfor influensområdet til Midtre prosjekt er sjeldne i et landskapsmessig perspektiv, både i regional og nasjonal sammenheng. Bekkekløfter og fossesprutsoner med tilsvarende rik epifyttvegetasjon er ikke tidligere påvist i Vefsn kommune, men særlig viktige bekkekløfter m.h.p. lavflora (og andre organismegrupper) finnes tilknyttet Vefsna-vassdraget i Grane og Hattfjelldal kommune. En viktig forskjell er imidlertid at Vikdalsvassdraget ligger i en mer oseanisk klimasone med generelt bedre forhold for epifytter og andre fuktighetskrevede kryptogamer sammenlignet med dalførene lenger øst.

2 BESKRIVELSE AV TILTAKET

2.1 Hoveddata

Midtre Vikdal Kraftverk, hoveddata		
TILSIG		
Nedbørfelt	km ²	31,0
Årlig tilsig til inntaket	mill.m ³	81,9
Spesifikk avrenning	l/s/km ²	83,7
Middelvannføring	m ³ /s	2,60
Alminnelig lavvannføring	m ³ /s	0,064
5-persentil sommer (1/5-30/9)	m ³ /s	0,411
5-persentil vinter (1/10-30/4)	m ³ /s	0,037
KRAFTVERK		
Inntak	moh.	179
Avløp	moh.	102
Lengde på berørt elvestrekning	m	720
Brutto fallhøyde	m	77
Midlere energiekvivalent	kWh/m ³	0,177
Slukeevne, maks	m ³ /s	4,7
Slukeevne, min	m ³ /s	0,235
Tilløpsrør, diameter	mm	1400
Tunnel, tverrsnitt	m ²	-
Tilløpsrør/tunnel, lengde	m	710
Installert effekt, maks	MW	3,0
Brukstid	timer	3010
MAGASIN		
Magasinvolument	Mill. m ³	-
HRV	moh.	-
LRV	moh.	-
PRODUKSJON		
Produksjon, vinter (1/10 - 30/4)	GWh	2,9
Produksjon, sommer (1/5 - 30/9)	GWh	6,1
Produksjon, årlig middel	GWh	9,0
ØKONOMI		
Utbyggingskostnad	mill.kr	22,4
Utbyggingspris	kr/kWh	2,49

Midtre Vikdal Kraftverk, Elektriske anlegg		
GENERATOR		
Ytelse	MVA	3,3
Spenning	kV	0,69
TRANSFORMATOR		
Ytelse	MVA	3,3
Omsetning	kV/kV	0,69/22
NETTILKNYTNING (kraftlinjer/kabler)		
Lengde	Km	2,4
Nominell spenning	kV	22
Luftlinje el. jordkabel		Jordkabel

2.2 Teknisk plan for det søkte alternativ

2.2.1 Hydrologi og tilsig

Vikdalselva har et nedbørfelt på 31,0 km² ved inntaket. Feltarealet er 32,3 km² ved kraftstasjonen, middelvannføringen til kraftverket over perioden 1961-1990 er beregnet til 2,596 m³/s. Alminnelig lavvannføring ved inntak er beregnet til 0,064 m³/s.

Persentiler (5 %) for sommer og vinter er beregnet å være hhv 411 l/s og 37 l/s for tilsig til inntaket.

Tabellen under viser feltareal og tilsig ved de viktigste punktene i vassdraget.

	Feltstørrelse (km ²)	Spesifikk avrenning (l/s/km ²)	Midlere årlig tilsig (mill.m ³ /år)	Midlere vannføring (m ³ /s)
Inntak Midtre	31,01	83,7	81,9	2,596
Restfelt Kraftstasjon	1,25	71,6	0,9	0,028
Totalfelt Vikdalselva	39,20	80,1	99,0	3,138

NVE's avrenningskart for perioden 1961-1990 er benyttet som grunnlag for beregning av spesifikk avrenning for feltene.

Det foreligger ingen registreringer av vannføring i feltet i dag. For å beskrive vannføringens variasjon over året er Vannmerke 156.15 Forsbakk (1964-2002) skalert og benyttet. Flere serier i området er vurdert men denne serien ble valgt på grunn av lengde på serien og antatt god representativitet. Det finnes registreringer fra nabovassdraget Hundåla, de mest aktuelle er tilsigsserien til 151.3 Hundålvatn samt vannføringsserien fra 151.11 Lavvatn. Seriene er av mindre god kvalitet, spesielt på lave vannføringer og er derfor ikke brukt videre.

Se vedlegg 4 for varighetskurver og kurver over vannføringen i typiske år.

2.2.2 Dam og inntak

Det planlegges bygget en betongdam, ca. 4-5 m høy. Damlengden vil bli ca. 15 m. En enkel inntakskonstruksjon med varegrind, minstevannføringsarrangement og stengeanordning bygges i enden av inntaksdammen på østsida av elva.

Inntaksbassengets overflate vil utgjøre ca. 2000 m², som i praksis også blir neddemt areal. Oppdemt volum blir ca 4000 m³.



Figur 1: Aktuelt inntaksområde, planlagt inntaksdam og neddemt område omtrentlig inntegnet.

2.2.3

Vannvei

Kart over vannvei er vist på vedlegg 3. Fra inntaket legges et rør (dia 1400 mm) i sprengt grøft østover fra inntaket. Øvre/midtre del av vannveien vil bli lagt i sprengt grøft, deler av midtre parti er svært bratt og rørgata er tenkt lagt i dagen og festet med braketter til fjell. Nedre del av rørgata legges i nedgravd grøft, eventuelt sprengt grøft dersom det er lite løsmasser.

Det vil bli nødvendig med noe hogst langs deler av vannveien da en del av rørtraséen går gjennom skog. Bredden på ryddet trasé vil være ca 20 meter. I driftsfasen må en om lag 5 m bred trasé holdes fri for større trær.

Røret får en lengde på ca. 710 m fra inntaket ned til kraftstasjon.

2.2.4

Kraftstasjonen

Kraftstasjonen er tenkt plassert på østsida av elva like oppstrøms utløpet av Øver-Kleivbekken. Kraftstasjonen foreslås plassert i et bygg på ca 100 m² på ca kote 102. Kraftstasjonen vil få en slukeevne på ca 4,7 m³/s og en installert effekt på ca 3,0 MW. Det vil være mest aktuelt med to turbiner, enten to francismaskiner eller en kombinasjon av francis og pelton.

Generatorspenningen blir på 690 V, og det installeres en 0,69/22 kV transformator. Generator- og trafoytelsen blir på 3,3 MVA.



Figur 2: Kraftstasjonsområde sett fra utløpskanal mot rørgate

2.2.5 Veibygging

Det vil være begrenset behov for veibygging i forbindelse med anlegget, det går en eksisterende traktorvei langs hele utbyggingsstrekningen. Eksisterende skogsvei er tenkt oppgradert, og det planlegges bygget 100 meter ny vei fram til inntaket og 100 meter ny vei til kraftstasjonen. Veiens bredde vil være ca. 3,5 meter.

2.2.6 Kraftlinjer

Det er planlagt lagt en 22 kV nedgravd kabel fra kraftstasjonen i en om lag 0,5 m bred grøft langs vei til påkoblingspunkt på eksisterende kraftlinje i Vikdalen som er planlagt oppgradert. Kraftlinjen kobles til linjen som kommer fra Øvre Vikdal kraftverk og til Nedre Vikdal kraftverk. Avstanden fra kraftstasjonen for Midtre Vikdal kraftverk til stasjonen for Nedre Vikdal kraftverk er på om lag 2 km, total kabellengde fra Midtre Vikdal kraftverk til eksisterende linje blir ca. 2400 m. Linjetraséen er vist i på kartet i vedlegg 2.

Netteier Helgelandskraft har sett på nettløsning fra de 3 kraftverkene i Vikdalen, og det blir en egen produksjonsradial til Mosjøen med sjøkabel over Vefsenfjorden. Dette henger også sammen med en større Nettstudie for Helgeland Salten som var ferdig vinteren 2008.

2.2.7 Massetak, deponi og rigg

Det er ikke planlagt tunnel drift så det blir begrenset behov for deponering av masser. Noe masse vil bli til overs fra grøftarbeid men det antas at dette vil kunne brukes på prosjektet til blant annet oppgradering av skogsvei eller andre formål så det er ikke planlagt noe permanent deponi. Midlertidig deponering blir hovedsakelig ved inntak og kraftstasjon.

Hovedrigg er tenkt plassert ved kraftstasjonsområdet, mens mindre riggområder for lagring av rør og for arbeider på dam og inntak plasseres ved

inntaket og langs rørtraséen. Det vil sannsynligvis bli behov for et mindre riggområde ved skogsveien ovenfor det bratteste partiet av rørtraséen.

2.2.8 Kjøremønster og drift av kraftverket

Kraftverket har ingen reguleringsmagasin, og inntaksbassenget er så lite at effektkjøring ikke er mulig. Anlegget vil derfor gå på det til enhver tid tilgjengelige tilsig. Når restvannføring i elva etter minstevannslipp blir lavere enn minste turbinslukeevne (ca. 90 l/s) vil turbinen stoppes, og vannet slippes over dammen. Minste slukeevne vil være avhengig av valgt turbinløsning og kan bli både mindre og større enn det som her er antatt.

2.3 Kostnadsoverslag

Det er utarbeidet et kostnadsoverslag for den planlagte utbygginga, basert på prisenivå ca. medio 2007. Kostnader til kraftlinje og transportanlegg vil være avhengige av hvilke av de omsøkte anleggene i Vikdalen som eventuelt får konsesjon da dette vil være felles investeringer for de tre aktuelle anleggene.

Midtre Vikdal Kraftverk	(mill. NOK)
Reguleringsanlegg	-
Overføringsanlegg	-
Inntak og dammer	0,8
Vannvei	5,2
Kraftstasjon. Bygg	2,5
Kraftstasjon. Maskin/elektro	8,7
Kraftlinje	
Transportanlegg	0,4
Div. tiltak (terskler, landskapspleie, med mer) 2 %	0,4
Uforutsett 10 %	1,8
Planlegging. Administrasjon 8 %	1,6
Finansieringsutgifter og avrunding 5 %	1,1
Sum utbyggingskostnader	22,4

2.4 Fordeler og ulemper ved tiltaket

2.4.1 Kraftproduksjon

Ved full utbygging vil midlere årlig produksjon være på ca. 9,7 GWh/år uten vannslipping. Produksjonen, inkl. foreslått vannslipping på 411 l/s i perioden 1. mai til 30. september og 37 l/s resten av året vil være (GWh/år):

Sommer	Vinter	Årlig
6,1	2,9	9,0

På årsbasis vil ca. 62 % av vannet passere turbinen.

2.4.2 Prosjektøkonomi

Utbyggingskostnaden for Midtre Vikdal Kraftverk er beregnet til 2,46 kr/kWh. Denne kostnad inkluderer ikke anleggsbidrag til netteier.

2.4.3 Kommuneøkonomi

For Vefsn kommune vil kraftverket bidra med økte skatteinntekter. Andre umiddelbare fordeler vil først og fremst være sysselsettingsgevinst i utbygningsperioden, og noe sysselsetting i driftsperioden.

2.4.4 Ulemper

Utbyggingen kan medføre negative konsekvenser for prioriterte naturtyper i området pga. redusert vannføring. Se for øvrig kapittel 3.2.8 og vedlagt rapport fra Biofokus. Vannføringsreduksjon og andre inngrep vil også ha negativ påvirkning på landskapet, men det meste av berørt elvestrekning er skjermet pga. topografi og vegetasjon. Nye tekniske inngrep og anleggsaktivitet vil kunne ha negative effekter for reindriften. Se nærmere vurderinger i kapittel 3.

2.5 Arealbruk, eiendomsforhold og offentlige planer

2.5.1 Arealbruk

Tabell nedenfor viser arealbruk for ulike anleggskomponenter

Komponent	Areal (dekar)	Permanent / Midlertidig
Rørtrasé (5m bredde)	3,5	Permanent
Dam og inntak	1,5	Permanent
Vei til dam (ny)	0,5	Permanent
Kraftstasjon	0,5	Permanent
Atkomstvei kraftstasjon	0,5	Permanent
Totalt (permanent)	6,5	
Rørtrasé	11	Midlertidig
Riggområde, kraftstasjon	1	Midlertidig
Riggområde, inntak	1	Midlertidig
Totalt (midlertidig)	13	

2.5.2 Eiendomsforhold

Fjellkraft har inngått avtale med eiere av all berørt grunn. Berørte grunneiere/eiendommer er vist i tabellen under.

Navn	Adresse	Gnr.	Bnr.
Stig Vikdal	8655 Mosjøen	14	1
Ise Vikdal	8651 Mosjøen	14	7

2.5.3 Samlet plan for vassdrag

Vassdraget er ikke vurdert i Samla plan.

2.5.4 Verneplaner, kommuneplaner og andre offentlige planer

Tiltaksområdet er i kommuneplanen regulert som LNF-område. Vassdraget er ikke vernet, men grenser helt i sør opp mot Sørvassdalselva som er et vernet vassdrag. Sørvassdalselva renner ut i det regulerte Hundålvatnet.

2.6 Alternative utbyggingsløsninger

Ingen vesentlige alternativer er vurdert, inntaksdammen kan vurderes flyttet noe opp eller ned i forhold til planlagt avhengig av grunnforhold mm, det er

ingen alternative kraftstasjonsplasseringer som synes aktuelle. En alternativ løsning for vannveien innebærer å bore ca 300 meter sjakt gjennom Forsskolten for så å legge rørgate resterende del. Denne løsningen er mer usikker geologisk og teknisk og er derfor ikke vurdert detaljert. Denne løsningen vil også bli en del dyrere.

3 VIRKNING FOR MILJØ, NATURRESSURSER OG SAMFUNN

3.1 Metode

3.1.1 Datagrunnlag

Vurderingene i denne rapporten er basert på foreliggende informasjon og naturfaglige registreringer i og ved Vikdalselva utført av Jon T. Klepsland 9-11. oktober 2006. En befaring ble foretatt av Pål Høberg i midten av november 2006. Undertegnede er ikke kjent med at det tidligere er foretatt naturtypekartlegginger eller andre registreringer relatert til biomangfold i influensområdet.

Tilgjengelige databaser over lav (Norsk LavDatabase), sopp (Norsk SoppDatabase), karplanter (karplantedatabasen), og fugler (Norsk hekkefuglatlas) er gjennomgått.

Alle registrerte arter er sammenholdt med den nasjonale rødlisten for truede arter i Norge (Artsbatabanken 2006). Truethetskategoriene er angitt som RE (direkte truet), CR (kritisk truet), EN (sterkt truet), VU (sårbar) og NT (nær truet).

Informasjonen om tap av inngrepsfrie naturområder er basert på Direktoratet for naturforvaltnings oversikt (INONver0103) og lokaliseringen av de planlagte anleggskomponentene.

Urørt natur og villmark er definert entydig under begrepet Inngrepsfrie naturområder (Direktoratet for naturforvaltning, 1995).

Informasjon om kulturminner og kulturmiljøer er innhentet fra grunneier og fra kulturminnedatabasen Askeladden (<http://askeladden.ra.no/sok/>)

Informasjon om bruken av området til friluftsliv og landbruk er innhentet fra grunneier, Direktoratet for naturforvaltning (www.naturbase.no) og Brurskanken turlag.

Informasjon om vannforsynings- og resipientinteresser er innhentet fra grunneier.

For å karakterisere og evaluere landskapet benyttes metoden *Visual Management System*, som har blitt tilpasset og videreutviklet for norske forhold ved Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (Norsk institutt for skog og landskap).

Informasjon om samiske interesser er innhentet fra Fauske reindriftsforvaltning og vikarierende distriktsformann for Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt.

3.1.2 Prosedyre

Metodikken følger NVE-veileder nr. 3-2007, *Dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk* (Brodtkorb & Selboe, 2007). Selv om denne kategorien vannkraftutbygging ikke betinger utarbeidelse av en konsekvensutredning etter Plan- og bygningsloven, er det benyttet en standardisert og systematisk tretrinns utredningsprosedyre basert på Statens vegvesens Håndbok 140 om konsekvensanalyse. Dette er gjort for å gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger av vurderinger mer objektive, lettere å forstå og lettere å etterprøve

3.2 Områdebeskrivelse

3.2.1 Geologi og landskap

Vikdalen med Vikdalselva er en bred dal med klassisk U-form, et resultat av lang tids isskuring og slitasje fra breelver under istiden(e). Etter siste istid har elva trengt seg ned i de bløte sedimentære bergartene langs naturlige svakhetssoner (forkastningssprekker og lagdelinger) og stedvis gravd ut dype kløfter og gjel med bratte vegger og store trinn. Jettegryter etter slitasje fra stabile virvelstrømmer under isavsmeltingen forekommer også. Berggrunnen består i det vesentligste av ulike omdannede sedimentære bergarter av kambrosilurisk alder. Nedre del av vassdraget ligger imidlertid på eksponerte granittiske til diorittiske størkningsbergarter av eldre opphav (NGU 2007a). Størkningsbergartene er forvittringsresistente og basefattige. De sedimentære bergartene ovenfor er mer lettforvitrelig og gir bedre jordsmonn. Glimmergneis er vanligst, og den er relativt basefattig, men i høyere lagrekker og i indre del av dalen inngår også noe kalkrik marmor. Løsmassedekket er generelt tynt og består som regel enten av torv, bunnmorene eller skredmateriale (NGU 2007b). Langs rolige parti av vassdraget finnes elvetransporterte avsetninger, og nederst i Vikdalen finnes til dels mektige hav- og fjordavsetninger som brukes til landbruksformål.

3.2.2 Klima


I følge Moen (1998) ligger øvre del av vassdraget i klart oseanisk seksjon (O2), mens nedre del tilhører svakt oseanisk seksjon (O1). Klimaet i oseaniske seksjoner karakteriseres av relativt små variasjoner i temperaturen gjennom døgnet og året, relativt milde vintre og fuktige, kjølige somre. Med hensyn på vegetasjonssoner så strekker Vikdalsvassdraget seg fra mellomboreal (Mb) gjennom nordboreal (Nb) og over i alpine soner (A). Nedbørsnormalen for de nærmeste meteorologiske målestasjonene (Mosjøen og omegn) ligger på omkring 1800 mm i året. Temperaturnormalen (årgjennomsnittet) for samme området er ca 3,6 °C ved havnivå og ca 0,2 °C ved ca 600 moh (Meteorologisk institutt 2007).

3.2.3 Avgrensning av tiltaks- og influensområdet

Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved gjennomføring av det planlagte tiltaket og tilhørende virksomhet, mens influensområdet også omfatter de tilstøtende områder der tiltaket vil kunne ha en effekt.

Tiltaksområdene vil derfor omfatte arealene rundt inntaksdammen og langs rørgatene, samt kraftstasjonen med tilhørende veier.

Influensområdet for biologisk mangfold og verneinteresser defineres her som vassdraget mellom inntaksdammen til kraftstasjonen, samt en 100-200 meter bred sone rundt de planlagte tiltakene inntaksdam, rørgate og kraftstasjon. Dette er en relativt grov og skjønnsmessig vurdering basert på hvilke naturmiljøer og arter i området som kan bli direkte eller indirekte berørt av tiltaket. Influensområdet utgjør undersøkelsesområdet. I enkelte tilfeller er også potensielt interessante naturmiljø utenfor hva som er betraktet som influensområder tillagt et kort besøk. Influensområdet for andre deltema varierer og er vurdert etter skjønn.



Figur 1. Berggrunnsgeologien i Vikdalen og omkringliggende områder. Midtre Vikdal kraftverk samt to kraftverk planlagt oppstrøms og nedstrøms (ikke utredet her) er inntegnet.

3.2.4 Hydrologi

Dagens vannføring i elva er preget av jevnt høy vannføring utover størstedelen av våren og sommeren og mer ujevnt tilsig med flere regnflommer utover høsten. Det kan opptre flommer på vinteren også men det er mer sjelden og vannføringen er jevnt over svært lav på vinteren.

Utbyggingen vil påvirke vannføringsforholdene mellom inntaket og utløpet fra kraftstasjonen. Utenom flomperioden og perioder med så lav vannføring at turbinen stanses vil vannføring her bestå av vannføring fra restfeltet på 28 l/s (midlere) pluss minstevannføring sluppet ved inntaksdammen.

Vannføring over året i Vikdalselva, er vist i figurer i vedlegg 4. Disse viser bl.a. vannføringen ved inntak før og etter utbyggingen i et vått, tørt og middels år og med to ulike minstevannføringer. Det er vist minstevannføringer på 64 l/s (alminnelig lavvannføring) i perioden 1. mai til 30. september, samt 411 l/s i samme periode og 37 l/s resten av året (5-persentiler).

Tabellen under viser antall dager med vannføring mindre enn minste slukeevne og større enn største slukeevne for det planlagte kraftverket.

		Antall dager mindre enn minste slukeevne+ minstevannføring	Antall dager mer enn største slukeevne
Tørreste år	1980	164	42
Midlere år	1984	152	62
Våteste år	1989	32	108

Vannføringen i byggefasen blir tilnærmet uendret.

3.2.5 Vanntemperatur, isforhold og lokalklima

Prosjektet har ingen nye reguleringsmagasin og dermed er det ikke forventet noen vesentlige endringer i is og vanntemperatur og risiko for frostrøyk eller isproblemer. På strekningen med redusert vannføring oppstrøms kraftstasjonen kan vanntemperaturen i kalde perioder uten snødekke bli noe lavere enn i dag.

3.2.6 Grunnvann, flom og erosjon

Ettersom vannføring synker kan grunnvannstanden i prinsippet forventes å synke svært lokalt rundt bekkeløpet. Elva går i et bratt juv på den aktuelle strekningen og har liten betydning på grunnvannsnivået i området langs elva. Det synes som om det er begrenset sedimenttransport i elva i dag, i hovedsak knyttet til flom. Tiltaket er ikke ventet å ha noen nevneverdig betydning for flomforhold nedover i vassdraget. I forbindelse med utbyggingen må brua oppstrøms inntaket vurderes i forhold til flomvannstander.

3.2.7 Flora og Fauna

Se vedlagt rapport fra Biofokus for en utfyllende vurdering.

Tiltaket ligger i øvre del av mellomboreal (Mb) sone (evt. nedre del av nordboreal). Berggrunnen består i øvre del av de lett forvitrelige bergartene glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein og amfibolitt. I nedre del av prosjektområdet finnes diorittisk til granittisk gneis og migmatitt, som forvitrer senere og gir mindre plantenæring. Vegetasjonsmessig er det granskog av ulike utforminger, særlig storbregnegranskog, som dominerer lisdene langs vassdraget. Løvdominerte parti finnes også, og er til dels rike på epifytter. For eksempel finnes i lisdene rett vest for planlagt plassering av kraftstasjon en rik løvblandingsskog/krattskog/gråor-heggeskog med rikkbarkstrær som selje rogn

og hegg, samt et frodig og artsrikt feltsjikt med arter som junkerbregne, hundekveke, kranskonvall, turt og skogstjerneblom. Flere steder, særlig nederst mot vassdraget finnes store felt med treløse bergvegger, sildreflater, rasmark og skrenter. Kryptogamfloraen er godt utviklet, men med unntak av enkelte mer kravfulle arter triviell. Det er for øvrig rike epifyttiske (og dels epilittiske) lavsamfunn, særlig innen Lobarion-samfunnet i bekkekløfta.

Det ble ikke gjort interessante observasjoner av vilt under kartlegging eller befarings, og ut over at det finnes elg i området er det ikke registrert viktige trekkruiter. Det finnes rødlistede rovdyr som gaupe (VU), jerv (EN) og kongeørn (NT) i Vikdalen. Forholdene ligger til rette for vassdragstilknyttede fugler slik som fossefall. Lenger vest ved Hundålvatnet er det påvist mulig hekking av arter som steinskvett (NT), heilo, ringtrost, heipiplerke og fjellrype, arter som sannsynligvis forekommer også i influensområdet. Det antas for øvrig at faunaen er representativ for resten av regionen.

Konsekvensen for fauna forventes å bli moderat, men redusert vannføring vil medføre et større negativt omfang for fuktrevende arter langs elva. Samlet sett vurderes konsekvensen som **middels til stor negativ (--/---)**.

3.2.8 Biologisk mangfold og verneinteresser

Det henvises til vedlagt rapport fra Biofokus for en utfyllende omtale av temaet.

Vegetasjon og naturtyper

To naturtypelokaliteter er registrert innenfor influensområdet til Midtre Vikdal kraftverk. Bekkekløft med regional verdi (B) omfatter den mest markerte delen av vassdraget og en stor del av området mellom inntak og kraftstasjon med liser like øst for Pelledalsfjellet og like vest for Kleivbekken. Flere vegetasjonstyper inngår, med storbregnegranskog og høystaudebjørkelier som dominerende. Det finnes også rik løvblandingsskog/krattskog/gråor-heggeskog med mange rikkbarkstrær og et frodig feltsjikt. Rikkbarkstræene er rike på epifytter, særlig lobarion-arter, og enkelte regionalt sjeldne og svakt sørlige lavarter opptrer spredt. Flere steder, men særlig nederst mot vassdraget er det store felt med treløse bergvegger, sildreflater, rasmark og skrenter. Her finnes enkelte kravfulle moser i en godt utviklet, men hovedsakelig triviell kryptogamflora. Ingen rødlistearter ble påvist, men lokaliteten viser stor variasjon i skogstyper, vegetasjonsutforminger og arts mangfold på tvers av organismegrupper.

I bekkekløfta finnes videre naturtypen fossesprøytsone avgrenset med nasjonal verdi (A). Her er det en klar sonering i vegetasjonen avhengig av kraften fosseet slår inn over land med. Den truede vegetasjonstypen fosse-eng (VU) inngår. Grantrær ved lokaliteten har en fuktrevende epifyttflora, samfunn som har smal økologisk nisje og dermed er svært sårbar overfor endrede fysiske og klimatiske forhold. Ingen rødlistede arter ble påvist, men det er potensial for slike.

Vilt

Det ble ikke gjort interessante observasjoner av vilt under kartlegging eller befarings. I følge registreringer i Rovbase forekommer jerv (EN), kongeørn (NT) og gaupe i Vikdalen. Forholdene ligger også til rette for vassdragstilknyttede fugler slik som fossefall. Lenger vest ved Hundålvatnet er det påvist mulig hekking av arter som steinskvett (NT), heilo, ringtrost, heipiplerke og fjellrype.

Fylkesmannen har ingen opplysninger om viltregistreringer i området unntatt offentlig innsyn (Lars Sæter, pers.medd).

Rødlistede arter

Det forekommer i følge DNs Rovbase kongeørn (NT), gaupe (VU) og jerv (EN) i Vikdalen.

Det er ikke registrert rødlistede lav, sopp eller karplanter i tiltaks- eller . Det er imidlertid potensial for slike innenfor de avgrensede naturtypelokalitetene.

Inngrepsfrie naturområder (INON)

Tiltaket ligger i sin helhet i inngrespnære områder, men vil så vidt berøre areal i inngrepsfri sone 2 (1-3 km fra tyngre tekniske inngrep) og 1 (3-5 km fra tyngre tekniske inngrep) i området rundt Vikdalen. Verdien for INON vurderes derfor som liten.

Plan- og lovstatus

Vikdalselva er ikke et verna vassdrag, og er ikke omtalt i Samla plan for vassdrag. Rundtjørna, hvor Vikdalselva renner fra, ligger imidlertid knappe 2 km fra det verna nabovassdraget Sørvasdalselva, og nedbørsfeltet til Vikdalselva grenser til Sørvasdalselvas nedbørsfelt. Ca 14 km nord for naturreservatet Skjølægda (NVE Atlas 2007).

Plan- og bygningsloven (pbl) styrer og samordner areal- og ressursbruken i kommunene. Tiltaks- og influensområdet er avsatt som LNF-område i arealdelen av Vefsn kommuneplan. En konsesjon etter plan- og bygningsloven gir ikke automatisk tillatelse til endret arealbruk etter pbl. Når tiltak som søkes konsesjon ikke er i tråd med arealbruksformålet, kan kommunen kreve å få behandle arealbruken i prosjektet etter Plan- og bygningsloven. Dette kan gjøres ved utarbeiding av reguleringsplan eller ved at kommunen fatter vedtak om dispensasjon fra gjeldende plankrav. Dersom det gis konsesjon etter vannressursloven, ev. vassdragsreguleringsloven, er tiltaket unntatt byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven (kapittel XII til og med XVII).

Verdivurdering

To naturtyper er avgrenset innenfor influensområdet. Bekkekløften er vurdert som regionalt viktig, mens fossesprøytsonen er vurdert som nasjonalt viktig. I følge NVEs veileder har da det aktuelle området stor verdi for deltema naturtyper. Fosse-eng med klassisk vegetasjonssonering og spesielle samfunnsutforminger av fuktighetskrevenne kryptogamer er påvist. Vegetasjonstypen fosse-eng er rødlistet som sårbar (VU) (Fremstad og Moen 2001). Ingen rødlistearter er påvist, men en rekke regionalt sjeldne eller uvanlige arter innen flere økologiske grupper finnes. For deltema rødlistearter vurderes derfor området å ha liten verdi, mens for deltema truede vegetasjonstyper har området middels verdi. Området ligger i ikke-inngrepsfritt område, og en eventuell utbygging vil ikke redusere eksisterende INON-areal vesentlig. Området har derfor liten verdi for deltema INON.

Samlet vurderes områdeverdien som stor for tema naturmiljø inkludert biologisk mangfold.

Verdivurdering		
Liten	Middels	Stor
----- -----		
▲		

Mulig konsekvensomfang

Redusert vannføring vil påvirke de spesielle miljøbetingelsene i bekkekløfta, og være svært negativt for de spesialiserte artene i fossesprøytsonen.

Anleggsarbeid i forbindelse med framføring av rørgate vil medføre inngrep i bratt og rasutsatt terreng, og trolig forstyrre den naturlige vegetasjonen på bergflater og i urer med permanent virkning. Rydding av skogsvegetasjon i rørgatetraséen vil medføre økt solinnstråling og økt luftgjennomstrømning som i kombinasjon med redusert vannføring vil medføre ganske kraftig reduksjon og mindre stabilitet i luftfuktigheten. Dette vil gjøre at vegetasjonsbildet endrer seg og de mest fuktighetskrevenne artene forsvinner.

Tiltaket vil ha ubetydelig innvirkning på INON-areal, med tap av 0,05 km² fra INON-sone 2 (1-3 km fra tyngre tekniske inngrep) og omklassifisering av 0,02 km² fra INON-sone 1 (3-5 km fra tyngre tekniske inngrep) til INON-sone 2. Se tabell 1 og figur 2.

Når det gjelder rødlistede rovdyr og annet vilt i influensområdet forventes ikke negative konsekvenser ut over forstyrrelser i anleggsperioden.

Tabell 1. Tap og omklassifisering av inngrepsfrie naturområder ved bygging av Midtre Vikdalen kraftverk.


INON-sone	Avstand til tyngre tekn. inngrep	Direkte tap ¹	"Nedgradert" til lavere kategori	"Tilført" fra høyere kategori
Villmarksprega områder	> 5 km	0	0	0
Inngrepsfri sone 1	3-5 km	0	-0,02	0
Inngrepsfri sone 2	1-3 km	-0,05	0	+0,02
Sum		-0,05	-	-

¹ Angir direkte tap, dvs. areal som går fra en INON-kategori (villmarksprega områder, INON sone 1 eller INON sone 2) til å bli klassifisert som inngrepsnært areal (< 1 km fra tyngre tekniske inngrepet).

På bakgrunn av dette vurderes omfanget som middels negativt.

Omfang				
Stort neg.	Middels neg.	Lite / intet	Middels pos.	Stort pos.
-----	-----	-----	-----	-----
	▲			

Tiltaket forventes samlet sett å få **middels til stor negativ konsekvens (--/---)** for biologisk mangfold og verneinteresser.




Figur 2. Tap og omklassifisering av inngrepsfrie naturområder ved bygging av Midtre Vikdalen kraftverk.

3.2.9 Fisk og ferskvannsbiologi

Det henvises til vedlagt rapport fra Biofokus.


Verdivurdering

Vassdraget har ikke anadrom laksefisk så langt opp, og det er ikke kjent til at vassdraget her har andre viktige kvaliteter knyttet til ferskvannsfauna. Det finnes bekkørret i elva. Bunndyrfaunaen er ikke undersøkt. Verdien vurderes som liten. Det må imidlertid bemerkes at det er usikkerhet knyttet til denne vurderingen.



Mulig konsekvensomfang

Tiltaket vil redusere mangfold og produksjon av bunndyr og gi dårligere betingelser for bekkørret.



Konsekvensen vurderes som **liten negativ (-)**.

3.2.10 Landskap

Verdivurdering

Nedre del av tiltaksområdet ligger i landskapsregionen *fjordbygdene i Nordland og Troms*, underregion *Velfjorden/Vefsentrifjorden*. Øvre del av tiltaksområdet ligger i *lågfjellet i Nordland og Troms*, underregion *Hundålvassfjellan*. Førstnevnte landskapsform karakteriseres av fjordtrau og enten paleiske eller alpine/glasiale fjellmassiver, hvorav førstnevnte er mest utbredt og dessuten representativ for det aktuelle området.

Lågfjellet i Nordland og Troms er preget av avrundede fjell og vidder. I Nordland er store deler av dette arealet preget av bart fjell eller tynt/usammenhengende løsmassedekke. Vegetasjonen viser stor artsvariasjon på grunn av geologi og klima, men er tynn og spredt i de øverste regionene. Det finnes generelt sett ikke dyrka mark, men forholdene for beiting er gode.

LANDSKAPSKOMPONENT	BESKRIVELSE
Landskapets hovedform	Varierer fra fjord med havavsetninger til lågfjell med topper på opp til om lag 800 meters høyde over havet. Hovedformen til Vefsnfjorden er dannet glasialt, og den går i SØ-NV retning fra Mosjøen før den bøyer av og går NØ-SV ut i havet. Vikdalselva og flere andre elver munner ut i fjorden. Vikdalselva renner igjennom den brede og U-formede Vikdalen.
Geologiske formasjoner	Berggrunnen består i det vesentligste av ulike omdannede sedimentære bergarter av kambrosilurisk alder. Nedre del av vassdraget ligger imidlertid på eksponerte granittiske til


LANDSKAPSKOMPONENT	BESKRIVELSE
	diorittiske størkningsbergarter av eldre opphav (NGU 2007a). Størkningsbergartene er forvittringsresistente og basefattige. De sedimentære bergartene ovenfor er mer lettforvitrelig og gir bedre jordsmonn. Glimmergneis er vanligst, og den er relativt basefattig, men i høyere lagrekker og i indre del av dalen inngår også noe kalkrik marmor. Løsmassedekket er generelt tynt og består som regel enten av torv, bunnmorene eller skredmateriale (NGU 2007b). Langs rolige parti av vassdraget finnes elvetransporterte avsetninger, og nederst i Vikdalen finnes til dels mektige hav- og fjordavsetninger som brukes til landbruksformål.
Vegetasjon	Vikdalsvassdraget strekker seg fra mellomboreal (Mb) gjennom nordboreal (Nb) og over i alpine soner (A). Terrenget heller i nordlig retning. Over skoggrensa finnes fattige lyngutforminger og tildels nakent berg med artsfattig epilittisk mangfold. På vestsiden av vassdraget finnes horisonter med marmor rikere vegetasjons-samfunn. I området hvor midtre kraftstasjon er tenkt lokalisert kler granskog lisidene. Her finnes løvdominerte parti rike på epifytter. Særlig ned mot vassdraget finnes store felt med treløse bergvegger, sildreflater, rasmark og skrenter, stedvis med godt utviklet og tilsynelatende triviell kryptogamflora. Her finnes også naturtypene bekkekløft og fossesprøytsone. Lokalt er vegetasjonen rikere, dvs med innslag av stauder og andre middels mineralkrevende urter i fuktigere områder langs vassdraget.
Vann og vassdrag	Vikdalselva er 13,5 km lang, og har flere tjern i lågfjellet. Elva renner i stryk, noen fosser, og i roligere partier. Flere andre elver renner ut i Vikdalselva. Hovedvassdraget hører inn under Vefsna/Vefsnfjorden sør (151). Nedbørsfeltet til havet (Vikdalselva 151.2Z) har en feltstørrelse på 39,2 km ² . Elvene i området er med på å øke variasjonen i landskapet og dermed opplevelseskvaliteten av området. Synligheten av Vikdalselva er god i lågfjellet; noe mindre i midtre deler på grunn av vegetasjon og topografi, og kun den aller nederste delen er synlig i fra fjorden og fra andre siden av fjorden. Her er den imidlertid en viktig del av kulturlandskapet.
Jordbruksmark	Det er to gårder nederst i Vikdalen med til sammen om lag 150 mål dyrka mark og 50 mål innmarksbeite. Dette ligger nedstrøms kraftverket. Sauedrift er eneste driftsform i tillegg til at grunneier driver noe hogst til eget bruk og begrenset salg.
Bosetning og tekniske anlegg	Grunneier er eneste fastboende familie i Vikdalen. Området har en lang bosetnings- og bebyggelseshistorie og har i eldre tid vært et aktivt bygdemiljø med mange småbruk basert på primærnæringer. Nede i dalen ligger et sagbruk

LANDSKAPSKOMPONENT	BESKRIVELSE
	fra ca 1910. Omtrent midt i dalen, oppstrøms Midtre Vikdalen kraftverk, finnes en gammel seter som ikke lenger er i drift. Det finnes noen hytter og fritidstomter og naust i nedre del av dalen. En skogsvei går langs østsiden av vassdraget sørover fra bebyggelsen ved havnivå og over til en traktorvei nesten inn til den planlagte plasseringen av kraftstasjonen for Øvre prosjekt Vikdalen kraftverk.

Det henvises til bilder i vedlegg 5.


Tiltaket ligger under skoggrensa. Av estetiske kvaliteter ved elva kan nevnes kraftige stryk og en stor foss med fallhøyde på mer enn 5 m der bunnkulpen med bergveggen rundt er restene av en stor jettegryte. Synligheten av elva i influensområdet til Midtre Vikdal kraftverk er liten både på grunn av vegetasjon og at elva går igjennom en bekkekløft med høye og bratte sidevegger.

Verdien vurderes som liten til middels.



Mulig konsekvensomfang

Tiltaket vil medføre redusert vannføring og sår i terrenget særlig ved etablering av rørgate. Redusert vannføring vil redusere fossens og elvas inntryksstyrke. Rørgatetraséen vil gå igjennom til dels bratt og ulendt terreng. Anleggsvirkksomheten i seg selv, og sprengning/graving i terreng med manglende eller lite løsmasser vil gi permanente spor. Rørgata vil også ligge oppe i dagen igjennom et parti. Omfanget av dette reduseres ved at elva er lite synlig i landskapet, og at deler av rørgatetraséen vil ligge skjermet i skogen. Verken trasé eller elv vil kunne sees fra bebyggelsen nederst i Vikdalen eller fra fjorden ettersom revegeteringen tiltar. Inntaksdammen, de to kortere strekninger med ny vei og kraftstasjonen vil også for en stor del være skjermet av skog. Omfanget vurderes som lite til middels negativt.



Konsekvensen vurderes som **liten negativ (-)**.

3.2.11

Kulturminner og kulturlandskap

Verdivurdering

Det finnes ingen automatisk fredede kulturminner i Vikdalen som det framgår av kulturminnedatabasen Askeladden. I følge Fylkeskommunen kommer tiltaket ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner, og potensialet for påvisning av hittil ukjente kulturminner er vurdert som lite (brev datert 21. juli 2010). Landskapet bærer preg av hogst og planting, også av fremmede treslag som vrifuru i nyere tid; og dalen har ellers vært brukt til beiteformål. Oppstrøms

influensoområdet ligger Vikdalssetra, som ikke vil bli berørt av tiltaket. Verdien vurderes som liten.

Verdivurdering		
Liten	Middels	Stor
----- -----		
▲		

Mulig konsekvensomfang

Ingen kjente kulturminner vil bli berørt, og tiltaket vurderes ikke å komme i konflikt med kulturlandskapet. Det bør dog vises oppmerksomhet for mulig forekomster i detaljplanlegging og bygging av rørgate, vei og kraftstasjon.

Tiltaket vurderes å ha **ubetydelig konsekvens (0)**.

3.2.12

Landbruk

Verdivurdering

Tiltaket berører ikke dyrket mark, men inngår i utmarksbeite for sau. Vikdalselva representerer en naturressurs i Vikdalen. Verdien vurderes som liten til middels.

Verdivurdering		
Liten	Middels	Stor
----- -----		
▲		

Mulig konsekvensomfang

Tiltaket vil medføre noe midlertidig tap av beiteareal til rørgatetrasé før revegeteringen tiltar, og noe areal til kraftstasjon og atkomstvei til denne. Tapet er imidlertid minimalt. Utbygging av Vikdalselva vil styrke næringsgrunnlaget i Vikdalen. Omfanget av utbyggingen vurderes som lite positivt.

Omfang				
Stort neg.	Middels neg.	Lite / intet	Middels pos.	Stort pos.
----- ----- ----- -----				
▲				


Konsekvensen vurderes som **liten positiv (+)**.

3.2.13

Vannkvalitet, vannforsynings- og resipientinteresser


Verdivurdering

Det er ingen kjente uttak av vann fra den berørte elvestrekningen, og ingen antropogene utslipp. Vannkvaliteten er ikke undersøkt. Verdien vurderes som liten.



Mulig konsekvensomfang

Utbyggingen vil ikke berøre vannuttak, og ventes ikke å endre vannkvalitet i vesentlig grad. Omfanget vurderes som lite/intet.



Konsekvensen vurderes som **ubetydelig (0)**.


3.2.14

Brukerinteresser/friluftsliv

Verdivurdering

Vikdalen er registrert som viktig friluftsområde med hovedegnethet for turer til fots eller på ski i fjellet, samt for å være en kulturattraksjon (Direktoratet for naturforvaltning 2007). Området er likevel i følge foreliggende opplysninger lite brukt til friluftsliv, ut over at det sannsynligvis har verdi for eierne av fritidseiendommene i nedre del av Vikdalen. Det går en årlig turmarsj opp igjennom dalen. Ut over dette er etter foreliggende opplysninger bruksfrekvensen lav. Videre er store deler av influensområdet bratt og ulendt, og dermed lite egnet for "vanlig" ferdsel. Det finnes elg i området, og grunneier driver begrenset jakt. Ellers finnes bekkeørret langs det meste av strekningen i følge grunneier.

Verdien vurderes som middels.



Mulig konsekvensomfang

De friluftslivsmessige konsekvensene av tiltaket er først og fremst knyttet til redusert vannføring og sår i landskapet etter nedlegging av rørgate.

Redusert vannføring vil medføre kun et begrenset omfang ettersom elvestrekningen som får fraført vann som følge av utbyggingen i stor grad ligger skjermet i en bratt og ulendt bekkekløft.

Jaktmulighetene i området vil ikke bli nevneverdig berørt av tiltaket. Støy i anleggsfasen vil imidlertid kunne føre til at viltet trekker seg bort fra området i en kortere periode. Bekkeørreten vil fremdeles kunne leve i de øvre uberørte delene av vassdraget samt i enkelte partier av berørt elvestrekning, og muligheter for småfiske er derfor ikke i vesentlig grad berørt.

Omfanget vurderes som lite negativt.

Omfang				
Stort neg.	Middels neg.	Lite / intet	Middels pos.	Stort pos.
-----	-----	-----	-----	-----
▲				

Tiltaket ventes å få **ubetydelig til liten negativ konsekvens (0/-)** for friluftsliv og brukerinteresser.

3.2.15

Reindriftsinteresser

Verdivurdering

Vefsn kommune hører inn under Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. Reinsdyr trekker fra vårbeite i Hundålaområdet til sommerbeite og tidvis også vårbeite i Vikdalen (Fallås, pers.med.). Det er registrert trekkroute opp igjennom Vikdalen (Reindriftsforvaltningen). Verdien vurderes som liten til middels.

Verdivurdering		
Liten	Middels	Stor
-----	-----	-----
▲		

Mulig konsekvensomfang

Tiltaket vil medføre noe tap av beiteareal inntil revegeteringen tiltar, samt permanent tap ved bygging av kraftstasjon og ny vei. Trekkruta i Vikdalen kan komme i konflikt med kraftstasjonene, da støy fra slike stasjoner kan medføre at reinen skyr området rundt. Rein som trekker helt ned i bebygde områder er trolig likevel ikke veldig var for støy, men kan trekke noe lenger øst for å unngå stasjonsområdet. Det forventes ikke en vesentlig økning i ferdsel i området etter anleggsperioden er over. Omfanget vurderes som lite til middels negativt.

Omfang				
Stort neg.	Middels neg.	Lite / intet	Middels pos.	Stort pos.
-----	-----	-----	-----	-----
▲				


Tiltaket vurderes å ha en **liten negativ konsekvens (-)** for reindriftsinteresser.

3.2.16

Samiske interesser


Verdivurdering

Det er ikke framkommet opplysninger om automatisk fredede samiske kulturminner i området, og det foreligger ikke opplysninger om andre samiske interesser. I følge Sametinget er det ikke registrert et eneste kulturminne i Vikdalen, og at dette trolig skyldes mangel på registreringer eller digitalisering av funn. Det er på dette grunnlaget vanskelig å si noe om potensialet for funn, men en rekke funn av samiske kulturminner i både Vefsn og Grane kommuner kan tyde på at det er potensial også i Vikdalen. Sametinget melder at det er sannsynlig at de vil gjøre mer omfattende søk og eventuelt foreta befarig i området når ferdige planer kommer ut på høring (e-post datert 18. august 2010). Verdien vurderes som liten.



Mulig konsekvensomfang

Ut i fra dagens kunnskap vil tiltaket ikke komme i konflikt med samiske interesser. Når detaljerte planer for utbyggingen foreligger, bør det foretas en vurdering av Sametinget hvor vidt området bør undersøkes nærmere. Det bør videre vises oppmerksomhet for mulige forekomster i detaljplanlegging og bygging av rørgate, vei og kraftstasjon. Omfanget vurderes som lite/intet.



Konsekvensen vurderes derfor som **ubetydelig (0)**.

3.2.17

Samfunnsmessige virkninger

En utbygging vil i noen grad styrke det lokale næringsgrunnlaget i området. I tillegg vil tiltaket kunne gi en marginal økning i skatteinntektene til Vefsn kommune, samt noe lokal sysselsetting i anleggsperioden. Dette gir en **liten positiv konsekvens (+)**.

Den regionale kraftsystemutredningen for Helgeland for 2009 viser at regionen har et kraftoverskudd, gjennomsnittlig overskudd er på 1,1 TWh de siste 10 årene, dette kan forventes å øke i årene framover. Det er i regionen 11 større kraftverk og 22 mini- og mikrokraftverk i drift pr 31.12.2008. I området er det gitt konsesjon på tre større anlegg med en produksjonskapasitet på ca 119 GWh, i tillegg kommer 11 mindre konsesjonsgitte anlegg på til sammen ca 111 GWh. I tillegg kommer eventuelt Ytre Vikna vindkraftanlegg med en kapasitet på opptil 870 GWh.

Vefsn kommune hvor prosjektet ligger har et betydelig kraftunderskudd, i følge lokal energitredning for Vefsn kommune fra 2009 er den lokale kraftproduksjonen i kommunen ca 0,3 TWh mens lokalt forbruk i 2008 var 3,3 TWh (5 % av dette andre kilder en elektrisitet), Alcoa Mosjøen står for 90 % av forbruket i kommunen.

3.2.18

Konsekvenser av kraftlinjer

Det er planlagt lagt nedgravd kabel fra kraftstasjonen langs vei til påkoblingspunkt på eksisterende kraftlinje. Inngrep kommer da i form av graving av kabelgrøft langs eksisterende og planlagt vei.

3.2.19

Konsekvenser ved brudd på dam og trykkrør

Konsekvensene ved et eventuelt brudd i dam og trykkrør vil være svært begrensede. Inntaksmagasinet har et svært lite volum og det forventes ikke vesentlige skader utover erosjonsskader langs øvre del av berørt elvestrekning. Ved brudd i trykkrør forventes det en del erosjonsskader i terreng mellom bruddstedet og elva. Ingen bygninger står i fare for å bli skadet ved et eventuelt brudd.

3.2.20 Konsekvenser av alternative utbyggingsløsninger

Alternativet med boring av sjakt vil bli noe mindre synlig sammenlignet med rør i dagen på det bratteste partiet. Å på denne måten trekke rørgata lenger øst vil også være gunstig ved at anleggsvirksomheten trekkes lenger bort fra den sårbare vegetasjonen i bekkekløfta. Ellers er konsekvensene stort sett like. Dersom det bores sjakt kan det bli behov for noe deponering av masser fra sjaktboring.

3.3 Samlet konsekvensvurdering

3.3.1 Midtre Vikdal kraftverk

Generell beskrivelse av situasjon og egenskaper/kvaliteter			
Det planlegges et kraftverk i midtre del av Vikdalselva i Vefsn kommune. Kraftverket vil installeres med en effekt på 3,0 MW, 710 m rørgate sprengt/gravd ned i grunnen og stedvis boltet til fjellet, og 200 m ny vei i tillegg til oppgradering av eksisterende skogsvei til kraftstasjonen. Det er registrert to naturtyper innenfor influensområdet, én med nasjonal verdi (A) og én med regional verdi (B). Disse dekker store deler av influensområdet, og vil bli negativt påvirket ved redusert vannføring og anleggsarbeid. Vikdalen er sommerbeite og tidvis vårbeite for tamrein, og støy fra kraftstasjoner kan føre til at reinen trekker noe unna. Topografi og vegetasjon gjør at tørlegging/ redusert vannføring, samt tekniske inngrep vil ha begrenset landskapsmessig betydning i denne delen. Det er trolig liten ferdsel i området i forbindelse med friluftsliv. Datagrunnlag klasse 2 (Middels).			
Datagrunnlag: Feltbefaringer oktober og november 2006; database over vilt/fugl/sopp/lav/karplanter/kulturminner; samtaler med grunneier, forvaltningsmyndigheter, og andre berørte parter.			
Tema	Verdi	Omfang	Konsekvens
Biologisk mangfold og verneinteresser	Stor	Middels negativt	Middels til stor negativ (---)
Flora og fauna	Stor	Middels negativt	Middels til stor negativ (---)
Fisk og ferskvannsbibliologi	liten	Lite negativt	Liten negativ (-)
Landskap	Liten	Lite negativt	Liten negativ (-)
Kulturminner	Liten	Lite/intet	Ubetydelig (0)
Landbruk	Liten til middels	Lite positivt	Liten positiv (+)
Vannkvalitet, vannforsynings- og resipientinteresser	Liten	Lite/intet	Ubetydelig (0)
Brukerinteresser/ friluftsliv	Liten	Lite negativt	Ubetydelig til liten negativ (0/-)
Reindriftsinteresser	Liten til middels	Lite til middels negativt	Liten negativ (-)
Samiske interesser	Liten	Lite/intet	Ubetydelig (0)
Samfunnsmessige interesser	-	-	Liten positiv (+)

3.3.2 Sumvirkninger av tre småkraftverk i Vikdalselva

Midtre Vikdal kraftverk ligger mellom to andre kraftverk det søkes konsesjon for i Vikdalselva. Det henvises til konsesjonssøknader for Øvre og Nedre Vikdal kraftverk for en utfyllende beskrivelse av disse.

Konsekvenser for miljø og ulike brukerinteresser av området varierer mellom de tre kraftverkene. De største konsekvensene for biologisk mangfold og verneinteresser er knyttet til Øvre og Midtre Vikdal kraftverk. Konsekvensene her er hovedsakelig knyttet til effekten av redusert vannføring på vegetasjon og dyreliv, samt direkte inngrep i prioriterte naturtyper. Ved utbygging av begge disse kraftverkene vil flere naturtypelokaliteter bli berørt, og lengden på elvestrekningen med redusert vannføring vil bli større og dermed mer negativt for en vassdragstilknyttet art som fossefall samt bunndyrfauna og fisk (bekkørret). I tillegg kommer anleggsaktivitet i en større del av Vikdalen som gir økt forstyrrelse for vilt. Når det gjelder INON, er det Øvre Vikdal kraftverk som gir utslag, mens de to kraftverkene nedstrøms har svært liten eller ingen konsekvens. Sumvirkningen for INON er derfor svært liten. Tap og omklassifisering av INON er vist i figur 3 og tabell 2.

For reindriftens bruk av Vikdalen kan det ikke utelukkes en negativ sumvirkning av tre utbygginger i vassdraget. Rein trekker i mange tilfeller vekk fra inngrep de forbinder med menneskelig aktivitet, og konsekvensen kan i så måte avhenge av hvordan dyrene opplever anleggsfasen. Et større utbyggingsområde og tre kraftstasjoner i stedet for en stasjon kan medføre et totalt sett større område som reinen trekker seg vekk i fra. Når det gjelder beitetap er dette trolig neglisjerbart begrenset ut i fra den totale utstrekningen av beiteområdet.


For tema som landskap og friluftsliv er det også naturlig at effekten av flere inngrep blir større enn av ett. Mulighetene for utøvelse av friluftsliv vil fortsatt være til stede, men forholdene for fiske i den grad dette foregår vil bli noe dårligere ettersom en større del av elva får fraført vann. Landskapsinngrepet blir totalt sett større, og det må dermed forventes at flere vil legge merke til det. Det er utbyggingen av det øvre kraftverket som kan slå mest negativt ut ettersom dette området per i dag er mest uberørt og mer tilgjengelig enn tiltaksområdet for det midtre kraftverket.

For både landskap/friluftsliv, reindrift og til dels naturmiljø kan det på den andre siden argumenteres at det er gunstig å samle inngrepene innenfor ett område framfor å gjøre små inngrep i flere vassdrag.

For deltema samfunn vil sumvirkningen totalt sett være positiv. Utbyggingskostnaden per kraftverk vil bli lavere blant annet ved at kostnadene av kraftlinje går ned ettersom startkostnaden kan fordeles på tre prosjekter. I tillegg kan frakt av byggematerialer og maskiner og etablering av motaksriggområde ved sjøen samt innhenting av anleggsarbeidere samkjøres. Noe besparelse på utforming av blant annet kraftstasjonsbygg kan også påregnes. Den totale utnyttelsen av kraftpotensialet i vassdraget blir selvfølgelig også større, men fremdeles har man kun utnyttet en del av vassdraget.

Tabell 2. Samlet tap og omklassifisering av inngrepsfrie naturområder ved bygging av Øvre, Midtre og Nedre Vikdal kraftverk.

INON-sone	Avstand til tyngre tekn. inngrep	Direkte tap ¹	"Nedgradert" til lavere kategori	"Tilført" fra høyere kategori
Villmarksprega områder	> 5 km	-	-	-
Inngrepsfri sone 1	3-5 km	-1,3	-10,5	-
Inngrepsfri sone 2	1-3 km	-4,5	-	+10,5
Sum		-5,8		



Figur 3. Tap og omklassifisering av INON ved utbygging av Øvre, Midtre og Nedre Vikdal kraftverk.

3.4 Avbøtende tiltak

3.4.1 Minstevannføring

Minstevannføring er et tiltak som ofte bidrar til å redusere de negative konsekvensene av en utbygging. Behovet for minstevannføring vil variere fra sted til sted, og alt etter hvilke temaer/fagområder man vurderer.

Vannressurslovens § 10 sier bl.a. følgende om minstevannføring:

“I konsesjon til uttak, bortledning eller oppdemming skal fastsetting av vilkår om minstevannføring i elver og bekker avgjøres etter en konkret vurdering. Ved avgjørelsen skal det blant annet legges vekt på å sikre a) vannspeil, b) vassdragets betydning for plante- og dyreliv, c) vannkvalitet, d) grunnvannsforekomster. Vassdragsmyndigheten kan gi tillatelse til at vilkårene etter første og annet ledd fravikes over en kortere periode for enkelttilfelle uten miljømessige konsekvenser.”

Betydningen av minstevannføring i Vikdalselva regnes som svært stor, først og fremst pga. det biologiske mangfoldet. For det biologiske mangfoldet er en stabil og tilstrekkelig vannføring særlig viktig. De fuktighetskrevede lav- og mosesamfunnene i fossesprøytonen kan forringes ved en vannføring som er for lav til å opprettholde luftfuktigheten på et minimumsnivå. Perioder med tørr og varm luft, særlig juli og august, er kritiske. Det anbefales derfor en minstevannføring som er tilstrekkelig for å opprettholde en nødvendig luftfuktighet for disse samfunnene. I tillegg vil en minstevannføring kunne opprettholde en viss bestand av bunndyr som næringsgrunnlag for ferskvannstilknyttet fugl.

Omsøkt alternativ baseres på slipping av minstevannføring på 411 l/s i perioden 1. mai til 30. september og 37 l/s resten av året. Dette gir en produksjon på 9,0 GWh (6,1 sommer og 2,9 vinter). Uten minstevannføring vil produksjonen være 9,7 GWh.

Dersom det slippes minstevann lik alminnelig lavvannføring på sommeren og ingen minstevannsslipp på vinteren (24 l/s 1/5-30/9 og 0 l/s resten av året), blir produksjonen 12,0 GWh (8,3 sommer og 3,7 vinter). Dette utgjør en reduksjon på 0,2 GWh i forhold til å ikke slippe noe og vil medføre en utbyggingspris på 2,09 kr/kWh.

Tabell 3. Behov for minstevannføring (skala fra 0 til +++).

Fagområde	Behov for minstevannføring
Biologisk mangfold	+++
Fisk og ferskvannsbiologi	+
Landskap	+
Landbruk	0
Kulturminner/kulturlandskap	0

Friluftsliv/brukerinteresser	+
Vannkvalitet/vannforsyning	0
Grunnvann	0

3.4.2 Anleggstekniske innretninger

Generelt sett bør de fysiske inngrepene i bekkekløfta begrenses til et minimum. Hogst innenfor de avgrensede naturtypene bør i størst mulig grad unngås.

Kraftverk, inntak, utløp

Kraftstasjonen er tenkt plassert på østsida av elva like oppstrøms utløpet av Øver-Kleivbekken. Det legges vekt på landskapsmessig tilpasning og at kraftstasjonen blir lite synlig i landskapet.

Dammen er planlagt like nedstrøms eksisterende bro over Vikdalselva, dam og inntak vil bli forholdsvis lite synlige fra brua og veien. Fra nedstrøms side er den mer synlig men det er her vanskelig atkomst og trolig ingen trafikk i dag.

Anleggsveier og transport

Det planlegges etablert anleggsveier i tilknytning til anlegget. Primært eksisterende veg/skogsbilvegtraséer følges, mens vegtraséer på 100 m etableres både opp til kraftstasjonen og inntak. Vegene bør etableres så smale som mulig, og gis en god landskapsmessig utforming.

Massetak og -deponier

Det er ikke planlagt tunneldrift så det blir begrenset behov for deponering av masser. Noe masse vil bli til overs fra grøftarbeid men det antas at dette vil kunne brukes på prosjektet til blant annet oppgradering av skogsvei eller andre formål så det er ikke planlagt noe permanent deponi. Midlertidig deponering blir hovedsakelig ved inntak og kraftstasjon. Dersom det skulle bli behov for permanent deponering er dette tenkt lagt ved kraftstasjon. Massene bør ikke deponeres i bekkekløfta.

Riggområder

Hovedrigg er tenkt plassert ved kraftstasjonsområdet, mens mindre riggområder for lagring av rør og for arbeider på dam og inntak plasseres ved inntaket og langs rørtraséen. Det vil sannsynligvis bli behov for et mindre riggområde ved skogsveien ovenfor det bratteste partiet av rørtraséen. Dette bør trekkes lengst mulig vekk fra bekkekløfta for å begrense hogsten der.

Det foreligger ingen planer for etterbruk av riggområdene, og riggområdene tilbakeføres mest mulig til naturtilstand ved anleggsarbeidets slutt.

Det anbefales at riggområdet tidlig avgrenses fysisk slik at anleggsaktivitetene ikke utnytter et større område enn nødvendig.

Vannveier

Utbyggingen innebærer etablering av rørgate fra inntaket og ned til kraftstasjonen. Der det er mulig graves røret ned evt. Legges i sprengt grøft og dekkes med løsmasser. Dette gjør at vannveien vil revegeteres etter at anleggsfasen er avsluttet. Traséen lages så smal som mulig og arronderes etter avslutning. Med tanke på den sårbare vegetasjonen i bekkekløfta er det best om montering av rørgata kan skje med kran eller lignende ovenfra framfor bruk av stillas eller lignende nedenfra.

3.4.3 Vegetasjonsetablering og landskapspleie

De lokalklimatiske forholdene tilsier at det skal være gode vilkår for reetablering av naturlig vegetasjon der hvor løsmassedekket er tilstrekkelig. Avdekningsmassene behandles med omhu og legges tilbake som toppdekke. Aktive tiltak som planting/tilsåing vil da ikke være like nødvendig.

3.4.4 Avfall og forurensning

Alt anleggsarbeid forutsettes gjennomført slik at det ikke blir utslipp av forurensning eller at det blir liggende igjen avfall i anleggsområdene.

4 OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER/OVERVÅKNING

Ved en eventuell realisering av kraftverksprosjektet bør det settes i gang overvåkningsprogram for de mest sårbare samfunnene og artsforekomstene som vil bli berørt. Kunnskapen om områdets betydning for vilt og fugler, herunder vassdragstilknyttede og klippehekkende arter er også noe mangelfull.

5 REFERANSER OG GRUNNLAGSDATA

Følgende informasjon er benyttet:

- NVE Atlas
- Hydrologiske vannmerkedata fra NVE.
- Økonomiske kart og M711-kart fra Statens kartverk
- NVEs kostnadsgrunnlag for små vannkraftverk (02/2000)
- Stig Vikdal (grunneier)
- Ivar Vikdal (grunneiers far)
- Lars Sæter (Fylkesmannens miljøvernavdeling i Nordland)
- Roy Brubakk (Brurskanken turlag, lokal medlemsforening av Den norske turistforeningen)
- Inkeri Eira Fallås (vikarierende distriktsformann i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt)

Brodtkorb, E. & Selboe, O. K. 2007. Dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk (1-10 MW). Veileder nr. 3/2007 (Revidert utgave av veileder 1-2004). Norges Vassdrags- og Energidirektorat, Oslo & Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim.

Direktoratet for naturforvaltning. <http://dnweb5.dirnat.no/nbinnsyn>

Direktoratet for naturforvaltning. 1995. Inngrepsfrie naturområder i Norge. DN-rapport 1995-6.

Direktoratet for naturforvaltning. 1999a. Kartlegging av naturtyper. Verdssetting av biologisk mangfold. DN-håndbok 13-1999.

Direktoratet for naturforvaltning. 2000. Kartlegging av ferskvannslokaliteter. DN-håndbok 15-2000.

Direktoratet for naturforvaltning. 2003. Inngrepsfrie naturområder i Norge. INONver0103. <http://www.dirnat.no>

Direktoratet for naturforvaltning. 2007. Rovbasen. www.rovbase.no

Fremstad, E. 1997. Vegetasjonstyper i Norge. NINA Temahefte 12. 279 sider

Fremstad, E. & Moen, A. (red). 2001. Truete vegetasjonstyper i Norge. NTNU Vitenskapsmuseet Rapport Botanisk Serie 2001-4: 1-231.

Kålås, J.A, Viken, Å. og Bakken, T. (red.) 2006. Norsk rødliste 2006 – 2006 *Norwegian Red List*. Artsdatabanken, Norway.

Meteorologisk institutt. 2007. met.no.

Miljøstatus.no. 2007. Miljøstatus i Norge.

Moen, A. 1998. Nasjonalatlas for Norge. Vegetasjon. Statens Kartverk, Hønefoss.

Norges Geologiske Undersøkelse. 2007a. www.ngu.no/kart/bg250.

Norges Geologiske Undersøkelse. 2007b. www.ngu.no/kart/losmasse.

Norsk institutt for skog og landskap. 2007. Landskapsregioner. www.nisk.no.

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) / Norsk institutt for naturforskning (NINA) / Direktoratet for Naturforvaltning (DN). Norsk Hekkefugleatlas. <http://www.fugleatlas.no/>

Nordland Fylkeskommune. Innspill om kulturminner: Forespørsel om kulturminner i forbindelse med utarbeidelse av konsesjonssøknad for tre småkraftverk i Vikdalselva. Brev datert 21.07.2010.

NVE Atlas. 2007. <http://arcus.nve.no/website/nve/viewer.htm>

Reindriftsforvaltningen. 2007. <http://www.reindrift.no>

Sametinget. Småkraftverk i Vikdalselva. E-post datert 18. august 2010.

Universitet i Oslo. Karplantedatabasen. http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/kar/nkd_b.htm

Universitet i Oslo. Lavdatabasen. <http://www.toyen.uio.no/botanisk/lav/>


Universitet i Oslo. Soppdatabasen. http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm


Kraftsystemutredning 2009-2025 Helgeland, Helgelandskraft 2009

Lokal energiutredning Vefsn kommune, Helgelandskraft 2009


Beliggenhet av Vikdalselva









Tilsig og restvannføring tørt år




Tilsig og restvannføring middels år



Tilsig og restvannføring vått år



Vannføringskurve for valgt vannmerke



Bilde 1: Inntaksområde, vannføring ca 1,4 m³/s



Bilde 2: Inntaksområde, sett fra dam og oppstrøms, vannføring ca 1,4 m³/s



Bilde 3: Inntaksområde, sett fra dam og oppstrøms, vannføring ca 0,4 m³/s (dvs ca planlagt minstevannføring sommer)




Bilde 4: Parti mellom inntak og kraftstasjon



Bilde 5: Oppstrøms utløp av kraftstasjon, vannføring ca 1,4 m³/s



Bilde 6: Oppstrøms utløp av kraftstasjon, vannføring ca 0,4 m³/s (dvs ca planlagt minstevannføring sommer)



Vedlegg 6: BM-rapport fra Biofokus

Småkraftverk i Vikdalselva, Vefsn kommune. Virkninger på biologisk mangfold

Jon T. Klepsland



Ekstrakt

Biofokus har på oppdrag fra Multiconsult AS foretatt naturfaglige registreringer og konsekvensvurderinger langs Vikdalselva i Vefsn kommune i forbindelse med prosjekterte planer for utbygging av tre småkraftverk i vassdraget.

Store naturverdier er registrert innenfor influensområdene for alle de tre kraftprosjektene. I alt er 4 naturtyper avgrenset ved feltbefaring høsten 2006, inkludert én fosserøyksone med nasjonal naturverdi (A-verdi).

I korte trekk vil en eventuell prosjektgjennomføring både isolert og samlet sett gjennom direkte og indirekte virkninger ha stor negativ konsekvens for eksisterende kjente naturverdier i og langs vassdraget.

Nøkkelord

Vefsn
Vikdal
Småkraftverk
Naturtyper
Biologisk mangfold
Naturmiljø
Konsekvens

Omslag

FORSIDEBILDER
Alle fotos: Jon T. Klepsland
Øvre: Lobarion-arter på rogn
Midtre: Fosserøyksone
Nedre: Vikdalen

LAYOUT
Blindheim Grafisk

ISSN: 1504-6370

ISBN: 978-82-8209-013-1

Biofokus-rapport 2007-7

Tittel

Småkraftverk i Vikdalselva, Vefsn kommune. Virkninger på biologisk mangfold.

Forfatter

Jon T. Klepsland

Dato

11.05.2007

Antall sider

30 sider

Publiseringstype

Digitalt dokument (Pdf). Som digitalt dokument inneholder denne rapporten "levende" linker.

Oppdragsgiver(e)

Multiconsult AS

Tilgjengelighet

Dokumentet er offentlig tilgjengelig.

Andre BioFokus rapporter kan lastes ned fra:
<http://biolitt.biofokus.no/rapporter/Litteratur.htm>

BioFokus: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Telefon 2295 8598

E-post: post@biofokus.no Web: www.biofokus.no

Forord

Stiftelsen Biofokus har på oppdrag fra Multiconsult AS foretatt naturfaglige registreringer og konsekvensvurderinger langs Vikdalselva i Vefsn kommune i forbindelse med prosjekterte planer for utbygging av tre småkraftverk i vassdraget. Geir H. Kiplesund har vært vår kontaktperson hos oppdragsgiver. For BioFokus har Jon T. Klepsland vært prosjektansvarlig og ansvarlig for utarbeidelse av konsekvensrapport for deltema naturmiljø. Even Høgholen, Løten har bistått med kontrollbestemmelse av lav og moser. Terje Blindheim og Sigve Reiso i BioFokus har med sine erfaringer bidratt i rapportarbeidet. Geir H. Kiplesund i Multiconsult takkes for samarbeidet. En spesiell takk rettes også til Even Høgholen.

Oslo, 11.05.2007

Jon T. Klepsland
BioFokus



Øvre del av Vikdalselva

Sammendrag

Bakgrunn

Fjellkraft AS og grunneier Stig Vikdal har planer om å bygge ut tre småkraftverk langs Vikdalselva i Vefsn kommune i Nordland. Statlige myndigheter (Direktoratet for naturforvaltning, Olje- og energidepartementet) stiller i slike forbindelser krav om undersøkelser av biologisk mangfold (inkludert rødlistearter og øvrig artsmangfold) i de deler av området som vil bli berørt av utbyggingen dersom planene realiseres. På oppdrag fra Multiconsult, som står for prosjekteringen, har BioFokus gjennomført en slik kartlegging innenfor et nærmere definert influensområde i og inntil utbyggingsområdet. På dette grunnlaget er det gjort en vurdering av virkningene av en eventuell realisering av eksisterende planer for naturverdier innenfor influensområdet.

Utbyggingsplaner

Langs Vikdalselva er det planlagt tre småkraftverk som i denne rapporten er referert til som hhv. Øvre; Midtre; & Nedre prosjekt. Alle tre kraftverk er planlagt utført etter samme prinsipp med en 3-5 meter høy inntaksdam, rørgate og kraftstasjon, hvorfra vannet tilbakeføres til elvestrengen. Ved eventuell realisering vil det være behov for opprusting av eksisterende traktorvei og anlegging av ny driftsvei til kraftstasjonen tilhørende Midtre prosjekt, samt å anlegge ny driftsvei inn til stasjonen og langs rørgatetraséen for Øvre prosjekt.

Metode

NVE har utarbeidet en veileder (Veileder nr. 1/2004) om "Dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk (1 – 10 MW)". Veilederen er kommet i revidert utgave i 2007 (Brodtkorb og Selboe 2007). Metoden som er presentert i veilederen er lagt til grunn i denne rapporten. I tillegg er Statens vegvesen sin mal for konsekvensutredninger fulgt (Håndbok 140) og sentrale deler av metodekapitlet i rapporten er hentet fra denne (Statens Vegvesen 1995).

Relevant kunnskap om biologisk mangfold og viktige naturverdier er hentet inn fra skriftlige kilder, databaser, personlige meddelelser og internett. I tillegg er det foretatt egne feltbefaringer i perioden 9–11. oktober 2006.

Vurdering av virkninger på naturmiljø

Det er registrert store naturverdier innenfor influensområdene for alle de tre kraftprosjektene. For Øvre prosjekt er de største naturverdiene knyttet til INON-status. I tillegg er det registrert en naturtype (høystaudebjørkeskog) som vil bli vesentlig negativt berørt ved eventuell prosjektgjennomføring. For Midtre prosjekt er det registrert store naturverdier tilknyttet fosserøyksone og bekkekløftmiljø. Prosjektgjennomføring vil trolig medføre store terrenginngrep i bekkekløften og redusert vannføring vil ha stor betydning for det spesielle artssamfunnet tilknyttet fosserøyksonen. For Nedre prosjekt vil en eventuell prosjektgjennomføring ha størst negativ konsekvens for vannmiljøet inkludert en reproduserende bestand av anadrom sjørret.

Prosjektene vurderes både isolert sett og samlet til å ha stor negativ konsekvens for eksisterende kjente naturverdier i og langs vassdraget.

Innhold

1	BAKGRUNN	6
2	UTBYGGINGSPLANENE.....	7
2.1	ØVRE PROSJEKT	7
2.2	MIDTRE PROSJEKT.....	7
2.3	NEDRE PROSJEKT	8
3	METODE	8
3.1	DATAGRUNNLAG	8
3.2	VURDERING AV VERDIER OG KONSEKVENSER	9
4	AVGRENSING AV INFLUENSOMRÅDET.....	12
5	STATUS-VERDI.....	12
5.1	KUNNSKAPSSTATUS	12
5.2	NATURGRUNNLAGET.....	12
5.2.1	<i>Geologi.....</i>	<i>12</i>
5.2.2	<i>Topografi</i>	<i>12</i>
5.2.3	<i>Klima</i>	<i>13</i>
5.2.4	<i>Menneskelig påvirkning.....</i>	<i>13</i>
5.3	NATURTYPELOKALITETER.....	14
5.3.1	<i>Kjerringmyrhaugen S.....</i>	<i>14</i>
5.3.2	<i>Vikdalselva, midtre.....</i>	<i>15</i>
5.3.3	<i>Vikdalselva, fossen.....</i>	<i>17</i>
5.3.4	<i>Vikdalselva, nedre.....</i>	<i>18</i>
5.3.5	<i>Pallan S.....</i>	<i>19</i>
5.4	ARTSMANGFOLD	20
5.4.1	<i>Øvre prosjekt</i>	<i>20</i>
5.4.2	<i>Midtre prosjekt</i>	<i>20</i>
5.4.3	<i>Nedre prosjekt.....</i>	<i>21</i>
5.5	INNGREPSSTATUS	21
5.5.1	<i>Øvre prosjekt</i>	<i>21</i>
5.5.2	<i>Midtre prosjekt</i>	<i>22</i>
5.5.3	<i>Nedre prosjekt.....</i>	<i>22</i>
5.6	KONKLUSJON – VERDI.....	22
5.6.1	<i>Øvre prosjekt</i>	<i>22</i>
5.6.2	<i>Midtre prosjekt</i>	<i>23</i>
5.6.3	<i>Nedre prosjekt.....</i>	<i>23</i>
6	OMFANG OG BETYDNING AV TILTAKET	24
6.1	OMFANG OG KONSEKVENSN.....	24
6.1.1	<i>Øvre prosjekt</i>	<i>24</i>
6.1.2	<i>Midtre prosjekt</i>	<i>25</i>
6.1.3	<i>Nedre prosjekt.....</i>	<i>25</i>
6.2	SAMMENLIGNING MED ØVRIGE NEDBØRFELT/ ANDRE NÆRLIGGENDE VASSDRAG	26
6.3	MULIGE AVBØTENDE TILTAK	26
6.3.1	<i>Øvre prosjekt</i>	<i>26</i>
6.3.2	<i>Midtre prosjekt</i>	<i>27</i>
6.3.3	<i>Nedre prosjekt.....</i>	<i>27</i>
7	VIDERE UNDERSØKELSER	27
8	SAMMENSTILLING	28
8.1	ØVRE PROSJEKT	28
8.2	MIDTRE PROSJEKT.....	29
8.3	NEDRE PROSJEKT	30
9	REFERANSER.....	31

1 Bakgrunn

St.meld. nr. 42 (2000-2001) om Biologisk mangfold formulerer nasjonale resultatmål for bevaring av biologisk mangfold. To av resultatmålene er:

- I truede naturtyper skal inngrep unngås, og i hensynskrevende naturtyper skal viktige økologiske funksjoner opprettholdes.
- Truede arter skal opprettholdes på eller gjenoppbygges til livskraftige nivåer.

I lys av dette har Olje- og energidepartementet i brev av 20.02.2003 stilt krav til utbyggere av småkraftverk om gjennomføring av en enkel, faglig undersøkelse av biologisk mangfold. I brevet heter det blant annet:

"Undersøkelsen forutsettes å omfatte en utsjekking av eventuelle forekomster av arter på den norske rødlista og en vurdering av artssammensetningen i utbyggingsområdet i forhold til uregulerte deler av vassdraget og/eller tilsvarende nærliggende vassdrag. Det kan fastsettes en minstevannføring i hele eller deler av året dersom den faglige undersøkelsen viser at dette kan gi en vesentlig miljøgevinst."

Som en konsekvens av dette ble det av NVE utarbeidet en veileder til bruk i slike saker (Brodtkorb & Selboe 2004): "Dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk (1 – 10 MW)". Revidert utgave av denne veilederen (Brodtkorb og Selboe 2007) er brukt som rettesnor for denne rapporten.

Hovedformålet med rapporten er å:

- Beskrive naturverdiene i området
- Vurdere konsekvenser av tiltaket for biologisk mangfold
- Vurdere behov for og virkning av avbøtende tiltak

En viktig problemstilling er å vurdere behovet for minstevannføring. I den forbindelse har vannressurslova i paragraf 10 følgende hovedregel; "Ved uttak og bortledning av vann som endrer vannføringen i elver og bekker med årssikker vannføring, skal minst den alminnelige lavvannføring være tilbake, hvis ikke annet følger av denne paragraf."

2 Utbyggingsplanene

Tre separate kraftutbyggingsprosjekter foreligger for Vikdalselva. Fjellkraft AS (prosjektansvarlig) har gitt de tre prosjektene følgende benevnelse (fra ovenfra og nedstrøms): 1) Vikdalselva Øvre kraftverk; 2) Vikdalselva Nedre Kraftverk; 3) Nedre Vikdalselva i Vefsn. Prosjektene er heretter kalt hhv: 1) Øvre; 2) Midtre; & 3) Nedre prosjekt.

2.1 Øvre prosjekt

I følge prosjekt-notat fra Multiconsult av 22.12.06 er inntaksdam planlagt plassert ved kote 478, evt. kote 470, og kraftstasjonen lagt på kote 221. Samlet lengde på rørgate blir ca 1700-1800 meter og med en fallhøyde på ca 260 meter. Rørgaten er av tekniske årsaker ønsket lagt på vestsiden av vassdraget ettersom topografien er noe mer ujevn og brattlendt på østsiden. Det er behov for anleggsvei langs rørgatetraséen, og rørgata vil måtte graves ned, evt. sprenges ned i berggrunnen, til en dybde av minst 1 meter (Kiplesund pers. medd.). Kraftstasjonen blir fundamentert på løsmasser. Fra kraftstasjonen vil vannet bli tilbakeført direkte til vassdraget. Det vil være behov for å anlegge ca 1 km med ny vei inn til kraftstasjonen i tillegg til oppgradering av eksisterende skogsvei. Linjetilknytting vil skje via jordkabel til linjenettet nede i Vikdalsgrenda.

Nedbørfeltet er på ca 11 km² med middels årsavrenning på ca 90 l/s/km². Middels årlig avrenning er på ca 0,96 m³/s og midlere årlig vanntilsig er ca 30,3 mill. m³/år. Dette gir en beregnet produksjon på 12,2 GWh/år i årlig middelværdi med bakgrunn i de talldata som er oppgitt i prosjektbeskrivelsen til Multiconsult av 22.12.2006.

2.2 Midtre prosjekt

I følge prosjekt-notat fra Multiconsult av 22.12.06 er inntaksdam planlagt plassert på ca kote 179, og kraftstasjonen lagt på kote 101. Ved befaring 11.10.2006 ble det vurdert en alternativ plassering av inntaksdammen litt nedstrøms for den som er oppgitt i planskissen. Samlet lengde på rørgate blir ca 700 meter og med en fallhøyde på 70-80 meter. Topografien vil by på noen tekniske problem (Kiplesund pers medd.), men prosjektet er av samme vurdert som gjennomførbart. Rørgaten er tenkt lagt til østsiden av vassdraget ettersom tilgjengeligheten er best der. Anlegg av rørgate og kraftstasjon på vestsiden vil trolig by på større teknisk utfordring og medføre flere knekkpunkter på rørgata. Ved anlegg av rørgate på østsiden vil det trolig være nødvendig å sprengte grøft for rørgata i øvre del av traséen og i midtre del av traséen hvor terrenget er svært bratt vil rørgata sannsynligvis måtte boltes til fjellsida.

Kraftstasjonen blir fundamentert på fast berg. Fra kraftstasjonen vil vannet bli tilbakeført direkte til vassdraget. Det vil være behov for å anlegge ny stikkvei på ca 150 meters lengde fra eksisterende skogsbilvei, samt oppgradering av denne. Linjetilknytting vil skje via jordkabel til linjenettet nede i Vikdalsgrenda.

Nedbørfeltet er på ca 31 km² med middels årsavrenning på ca 84 l/s/km². Middels årlig avrenning er på ca 2,60 m³/s og midlere årlig vanntilsig er ca 81,8 mill. m³/år. Dette gir en beregnet produksjon på 9,7 GWh/år i årlig middelværdi med bakgrunn i de talldata som er oppgitt i prosjektbeskrivelsen til Multiconsult av 22.12.2006.

2.3 Nedre prosjekt

I følge prosjekt-notat fra Multiconsult av 22.12.06 er inntaksdam planlagt plassert ved kote 73 og kraftstasjonen lagt på kote 12. Samlet lengde på rørgate blir 1100-1200 meter og med en fallhøyde på ca 60 meter. Topografien er jevn og derfor teknisk uproblematisk. Rørgaten er tenkt lagt til østsiden av vassdraget ettersom tilgjengeligheten er best der. Rørgata kan trolig i all hovedsak graves ned i løsmasser, men noe sprengning er trolig nødvendig oppe ved inntaket og et par steder videre nedover. Rørgata vil krysse noen bekker underveis hvor det ved eventuell realisering må gjøres noen ekstra tiltak for å flomsikre røra.

Kraftstasjonen blir fundamentert på løsmasser. Fra kraftstasjonen vil vannet bli tilbakeført direkte til vassdraget. Det vill ikke være behov for vesentlig oppgradering eller ny-anlegging av vei.

Nedbørfeltet er på ca 36 km² med middels årsavrenning på ca 82 l/s/km². Middels årlig avrenning er på ca 2,95 m³/s og midlere årlig vanntilsig er ca 93,2 mill. m³/år. Dette gir en beregnet produksjon på 8,7 GWh/år i årlig middelvei med bakgrunn i de talldata som er oppgitt i prosjektbeskrivelsen til Multiconsult av 22.12.2006.

3 Metode

Selv om det ikke skal foretas noen konsekvensutredning benyttes her Håndbok 140 for konsekvensutredninger (Statens vegvesen 1995) som metodegrunnlag for å vurdere virkningene på det biologiske mangfoldet. Dette er gjort for å gjøre vurderingene lettere forståelige og oversiktlige. For å unngå forveksling med konsekvensvurderinger etter plan- og bygningslova, er begrepsbruken noe endret (bl.a. er ikke 0-alternativet omtalt, og "konsekvensvurdering" er unngått som begrep).

3.1 Datagrunnlag

Datagrunnlag er et uttrykk for grundighet i utredningen, men også for tilgjengeligheten til de opplysningene som er nødvendige for å trekke konklusjoner på status/verdi og konsekvensgrad. Utbyggingsplanene og dokumenter er i den forbindelse mottatt fra Multiconsult ved Geir H. Kiplesund. Vurdering av dagens status for det biologiske mangfoldet i området er gjort på bakgrunn av litteraturgjennomgang og egen befaring i området i perioden 9-11. oktober 2006. Forholdene ved befaringen var gunstige for registrering av artsgruppene vedsopp, lav og mose, men noe sent for jordboende sopp og karplanter. Influensområdet er befart til fots langs hele strekningen mellom inntaksdam for Øvre prosjekt til kraftstasjon for Nedre prosjekt.

3.2 Vurdering av verdier og konsekvenser

Disse vurderingene er basert på en "standardisert" og systematisk tre-trinns prosedyre for å gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og lettere å etterprøve.

Trinn 1: Status/ Verdi

Verdsetting for tema biologisk mangfold er gjort ut fra ulike kilder og basert på metode utarbeidet av Statens vegvesen, Buskerud. Unntak er at geologi og kvartærgeologi ikke omhandles her.

Tabell 1: Tema og verdsetting for biologisk mangfold

Kilde	Stor verdi	Middels verdi	Liten verdi
Naturtyper www.naturbasen.no DN-Håndbok 13: Kartlegging av naturtyper DN-Håndbok 11: Viltkartlegging DN-Håndbok 15: Kartlegging av ferskvannslokaliteter	- Naturtyper som er vurdert til svært viktige (verdi A) - Svært viktige viltområder (vektall 4-5) - Ferskvannslokalitet som er vurdert som svært viktig (verdi A)	- Naturtyper som er vurdert til viktige (verdi B) - Viktige viltområder (vektall 2-3) - Ferskvannslokalitet som er vurdert som viktig (verdi B)	Andre områder
Rødlistede arter Norsk rødliste 2006 (www.artsdatabanken.no) www.naturbasen.no	Viktige områder for: - Arter i kategoriene "kritisk truet", "sterkt truet" og "sårbar". - Arter på Bern-liste II - Arter på Bonn-liste I	Viktige områder for: - Arter i kategoriene "nær truet" eller "datamangel". - Arter som står på den regionale rødlisten.	Andre områder
Truete vegetasjonstyper Fremstad & Moen 2001.	Områder med vegetasjonstyper i kategoriene "akutt truet" og "sterkt truet".	Områder med vegetasjonstyper i kategoriene "noe truet" og "hensynskrevende"	Andre områder
Inngrepsfrie og sammenhengende naturområder. Direktoratet for naturforvaltning.	- Villmarkspregede områder - Sammenhengende inngrepsfrihet fra fjord til fjell, uavhengig av sone - Inngrepsfrie områder (uavhengig av sone) i kommuner og regioner med lite rest-INON.	Inngrepsfrie naturområder forøvrig	Ikke inngrepsfrie naturområder

Verdien blir fastsatt langs en skala som spenner fra liten verdi til stor verdi (se eksempel).


Verdivurdering		
Liten	Middels	Stor

Trinn 2: Omfang

Trinn 2 består i å beskrive og vurdere type og omfang av mulige virkninger hvis tiltaket gjennomføres. Konsekvensene blir bl.a. vurdert ut fra omfang i tid og rom og sannsynligheten for at de skal oppstå. Omfanget blir vurdert langs en skala fra stort negativt omfang til stort positivt omfang (se eksempel).

Tabell 2: Kriterier for vurderinger av et planlagt tiltaks potensielle virkning på naturmiljø (tilpasset etter Statens Vegvesen sin håndbok 140 ((Statens Vegvesen 1995))).

	Store positive virkninger	Positive virkninger	Lite/ingen virkninger	Middels negative virkninger	Store negative virkninger
Naturtype-lokaliteter	Tiltaket vil i stor grad forbedre naturtype-lokaliteter m.h.p. forholdene for biologisk mangfold.	Tiltaket vil forbedre naturtype-lokaliteter m.h.p. forholdene for biologisk mangfold.	Tiltaket vil stort sett ikke endre naturtype-lokaliteter.	Tiltaket vil forringe naturtype-lokaliteter m.h.p. forholdene for biologisk mangfold.	Tiltaket vil ødelegge naturtype-lokaliteter og/eller ødelegge livsgrunnlaget for forekomster av truede og sårbare arter.
Viltområder	Tiltaket vil øke artsmangfoldet, forekomst av arter, eller bedre deres vekst- og levevilkår i betydelig grad.	Tiltaket vil øke artsmangfoldet, forekomst av arter, eller bedre deres vekst- og levevilkår.	Tiltaket vil stort sett ikke endre artsmangfoldet, forekomst av arter, eller deres vekst- og levevilkår.	Tiltaket vil i noen grad redusere artsmangfoldet, forekomst av arter, eller forringe deres vekst- og levevilkår.	Tiltaket vil i stor grad redusere artsmangfoldet, fjerne forekomst av arter, eller ødelegge deres vekst- og levevilkår.
Vassdrag og ferskvann	Tiltaket vil øke artsmangfoldet, forekomst av arter, eller bedre deres vekst- og levevilkår i betydelig grad.	Tiltaket vil øke artsmangfoldet, forekomst av arter, eller bedre deres vekst- og levevilkår.	Tiltaket vil stort sett ikke endre forholdene i vassdrag og ferskvann m.h.p. biologisk mangfold.	Tiltaket vil i noen grad redusere artsmangfoldet, forekomst av arter, eller forringe deres vekst- og levevilkår.	Tiltaket vil i stor grad redusere artsmangfoldet, fjerne forekomst av arter, eller ødelegge deres vekst- og levevilkår.
Inngrepsfrie områder	Tiltaket vil øke størrelsen på inngrepsfrie områder i betydelig omfang.	Tiltaket vil øke størrelsen på inngrepsfrie områder.	Tiltaket vil ikke berøre inngrepsfrie områder.	Tiltaket vil redusere størrelsen på inngrepsfrie områder i INON-sone 2 (1-3 km fra tyngre tekniske inngrep).	Tiltaket vil redusere størrelsen på inngrepsfrie områder i INON-sone 1 (3-5km fra tyngre tekniske inngrep) og/eller villmarkspregede områder (>5km fra inngrep).



Trinn 3: Betydning

Det tredje og siste trinnet i vurderingene består i å kombinere verdien (temaet) og omfanget av tiltaket for å få den samlede vurderingen av tiltaket

Denne sammenstillingen gir et resultat langs en skala fra svært stor positiv betydning til svært stor negativ betydning (se under). De ulike kategoriene er illustrert ved å benytte symbolene "-" og "+".

Symbol	Beskrivelse
++++	Svært stor positiv betydning
+++	Stor positiv betydning
++	Middels positiv betydning
+	Liten positiv betydning
0	Ubetydelig/ingen betydning
-	Liten negativ betydning
--	Middels negativ betydning
---	Stor negativ betydning
----	Svært stor negativ betydning

Oppsummering

Vurderingen avsluttes med et oppsummeringsskjema for temaet (Kap. 7). Dette skjemaet oppsummerer verdivurderingene, vurderingene av tiltakets omfang og betydning, samt en kort vurdering av hvor godt grunnlagsdataene for vurderingene er (kvalitet og kvantitet). Dette gir en indikasjon på hvor sikre vurderingene er.

Datagrunnlaget blir klassifisert i fire grupper som følger:

Klasse	Beskrivelse
0	Ingen data
1	Mangelfullt
2	Middels
3	Godt

4 Avgrensing av influensområdet

Influensområdet defineres her som vassdraget mellom øvre aktuelle plassering av inntaksdammen til nedre aktuelle plassering av kraftstasjonen, samt en 100-200 meter bred sone rundt de planlagte tiltakene; inntaksdam, rørgate og kraftstasjonen. I tillegg medregnes en ca 50 meter bred trasé langs eksisterende vei/ sti mellom de tre prosjektene ettersom det ved eventuell realisering av prosjektene kreves opprusting av denne. Dette er en relativt grov og skjønnsmessig vurdering basert på hvilke naturmiljøer og arter i området som kan bli direkte eller indirekte berørt av tiltaket. Influensområdet utgjør undersøkelsesområdet. I enkelte tilfeller er også potensielt interessante naturmiljøer utenfor hva som er betraktet som influensområder tillagt et kort besøk.

5 Status-Verdi

5.1 Kunnskapsstatus

Kunnskapsgrunnlaget angående naturverdier innenfor influensområdet i forkant av feltarbeidet vurderes som dårlig. Undertegnede er ikke kjent med at naturtype-registreringer eller andre biomangfold relaterte kartlegginger eller registreringer er foretatt innenfor prosjektenes influensområder tidligere. Noe kunnskap foreligger imidlertid for nedre del av Vikdalsvassdraget m.h.p. anadrome laksefisk. Hele vassdraget er i DNS lakseregister (Direktoratet for Naturforvaltning 2007c) kategorisert som et **5a** vassdrag for sjørret, d.v.s. vassdraget har en moderat/lite påvirket bestand av anadrom sjørret som er vurdert som spesielt hensynskrevende.

Nye feltundersøkelser ble foretatt av undertegnede i perioden 9-11 oktober 2006 for å avdekke eventuelle viktige lokaliteter for biologisk mangfold innenfor influensområdet. Årstid og værforhold var gunstige med tanke på dokumentasjon av de fleste kryptogamer (sopp, lav og moser), men noe sent for enkelte karplanter og marklevende sopp.

Kunnskapsstatus etter nye feltundersøkelser høsten 2006 vurderes som mangelfull, særlig innenfor ferskvannfauna, fugl, pattedyr, invertebrater og jordboende sopp, men tilstrekkelig for en analyse av effektene på andre undersøkte organismegrupper ved en eventuell realisering av prosjektene.

5.2 Naturgrunnlaget

5.2.1 Geologi

Berggrunnen består i det vesentlige av ulike omdannede sedimentære bergarter av kambrosilurisk alder. Nedre del av vassdraget ligger imidlertid på eksponerte granittiske til diorittiske størkningsbergarter av eldre opphav (NGU 2007a). Størkningsbergartene er forvittringsresistente og basefattige. De sedimentære bergartene ovenfor er mer lettforvitrelig og gir bedre jordsmonn. Glimmergneis er vanligst, og den er relativt basefattig, men i høyere lagrekker og i indre del av dalen inngår også noe kalkrik marmor.

Løsmassedekket er generelt tynt og består som regel enten av torv, bunnmorene eller skredmateriale (NGU 2007b). Langs rolige parti av vassdraget finnes elvetransporterte avsetninger, og nederst i Vikdalen finnes til dels mektige hav- og fjordavsetninger som brukes til landbruksformål.

5.2.2 Topografi

Vikdalen med Vikdalselva er en bred dal med klassisk U-form, et resultat av lang tids is-skuring og slitasje fra breelver under istiden(e). Etter siste istid har elva trengt seg ned i de bløte sedimentære bergartene langs naturlige svakhetssoner (forkastningssprekker

og lagdelinger) og stedvis gravd ut dype kløfter og gjel med bratte vegger og store trinn. Jettegryter etter slitasje fra stabile virvelstrømmer under isavsmeltingen forekommer også. På overordnet skala faller vikkalsvassdraget mest i øvre del (innenfor influensområdet for Øvre prosjekt), deretter flyter elva ganske rolig ned til starten av influensområdet for Midtre prosjekt. Her går elva over i kraftige stryk og en stor foss med fallhøyde på mer enn 5 meter der bunnkulpen med bergveggene rundt faktisk er restene av en stor jettegryte. Fra nedkant av influensområdet for Midtre prosjekt og ned til havnivå går elva for det meste over forvittringsresistente granittiske bergarter i et relativt jevnt fall uten skarpe kløftformasjoner eller fosser, men i en serie strie stryk. Strykene avløses stedvis av mer rolig flytende parti. Elva løper ut i en langsmal brakkvannsfjord.

5.2.3 Klima


I følge Moen (1998) ligger øvre del av vassdraget i klart oseanisk seksjon (O2), mens nedre del tilhører svakt oseanisk seksjon (O1). Klimaet i oseaniske seksjoner karakteriseres av relativt små variasjoner i temperaturen gjennom døgnet og året, relativt milde vintre og fuktige, kjølige somre. Med hensyn på vegetasjonssoner så strekker Vikdalsvassdraget seg fra mellomboreal (Mb) gjennom nordboreal (Nb) og over i alpine soner (A). Nedbørsnormalen for de nærmeste meteorologiske målestasjonene (Mosjøen og omegn) ligger på omkring 1800 mm i året. Temperaturnormalen (årgjennomsnittet) for samme området er ca 3,6 °C ved havnivå og ca 0,2 °C ved ca 600 moh (Meteorologisk institutt 2007).

5.2.4 Menneskelig påvirkning

Vikdalen har en lang bosetnings- og bebyggelseshistorie og har i eldre tid vært et aktivt bygdemiljø med mange småbruk basert på primærnæringene fiske, jordbruk og skogbruk. Nå er det bare én fastboende familie igjen i Vikdalen. Naturressursene langs Vikdalsvassdraget er sterkt utnyttet gjennom lang tid, men den historiske bruksmåten har variert med naturgrunnlaget og naturutformingene på en slik måte at en del naturlige trekk og økologiske prosesser er bevart. Barskogressursene er særlig tydelig utnyttet gjennom lang tid. Kontinuiteten i gamle trær og død ved er kraftig brutt for både gran og furu i hele nedbørsfeltet. I nyere tid er også en del fremmede treslag plantet inn (vri-furu). En driftsvei går parallelt med og på østsiden av vassdraget sørover fra bebyggelsen ved havnivå og nesten inn til den planlagte plasseringen av kraftstasjonen for Øvre prosjekt. Indre halvdel ligner mer en sti og krever derfor kraftig oppgradering i tilfelle utbyggingsplanene realiseres. Omtrent midt i dalen (oppstrøms Midtre prosjekt) ligger ei gammel seter som ikke lenger er i aktiv drift. Vikdalen sør for bebyggelsen er for øvrig fritt for tyngre tekniske inngrep.

5.3 Naturtypelokaliteter

Fem naturtypelokaliteter er registrert og kartfestet. To av disse ligger innenfor influensområdet til Midtre prosjekt, én ligger innenfor influensområdet til Øvre prosjekt, og én ligger innenfor influensområdet til Nedre prosjekt. I tillegg er én naturtypelokalitet registrert like utenfor det som er betraktet som influensområder. Tre av de registrerte naturtypene tilhører hovednaturtype "skog", og to tilhører hovednaturtype "ferskvann/ våtmark" etter DN-håndbok 13 (1999) og DN-håndbok 15 (2000). Beskrivelse og verdisetting av naturtypelokalitetene er gitt under.




Figur 1: Oversiktskart som viser beliggenhet til registrerte naturtyper.

5.3.1 Kjerringmyrhaugen S

Kommune:	Vefsn	Naturtype:	Bjørkeskog med høgstauder
Dato feltreg.:	09.10.2006	Veg. sone:	NB
Registrant:	Jon T. Klepsland	Høydelag:	ca 250-350 moh.
Kartblad N50:	1926 I	Areal:	?? daa
UTM (sentral):	VP 1120 0388	Verdi:	C

Lokaliteten omfatter en eldre boreal løvblandingsskog med bjørk, rogn, selje og gråor. Skogen varierer i struktur fra helt glissen til relativt kompakt med god kronedekning. Feltsjiktet karakteriseres av storvokste urter (stauder og bregner) og parti med intermedjær- og middelsrik myrvegetasjon der det er stor tilførsel av grunnvann. Relativt mange grove bjørk, rogn og seljetrær inngår. Aldersspredningen innen lokaliteten er god. Noe død ved av nevnte treslag forekommer. I øvre del av avgrensingen opptrer tørrere og mer grunnlendte utforminger på stabil og overgrodd blokkmark. Enkelte mer kalkkrevende arter finnes her, slik som taggbregne og grønburkne. Lokaliteten har en relativt marginal beliggenhet opp mot fjellet og ingen spesielt sjeldne arter eller rødlistearter er påvist. Lokaliteten vurderes derfor som lokalt viktig (C-verdi).




Figur 2: Detaljkart som viser beliggenhet til naturtype nr 1, Kjerringmyrhaugen S.


5.3.2 Vikdalselva, midtre

Kommune:	Vefsn	Naturtype:	Bekkekløft
Dato feltreg.:	09.10.2006	Veg. sone:	NB-MB
Registrant:	Jon T. Klepsland	Høydelag:	ca 100-280 moh.
Kartblad N50:	1926 I	Areal:	?? daa
UTM (sentral):	VP 1200 0620	Verdi:	B

Lokaliteten gjelder den mest markerte delen av Vikdalsvassdraget med lisider like øst for Pelledalsfjellet og like vest for Kleivbekken. Geografisk omfatter naturtype-objektet også en foss med tilhørende vegetasjonsutforminger, men denne er gitt egen beskrivelse ettersom "fosseryksone" er klassifisert som egen naturtype i DN-håndbok 13. Innenfor bekkeløften inngår mange ulike skog- og vegetasjonstyper. Arealmessig er det storbregne-granskog og frodige storbregne- og høystaudebjørkelier som er viktigst. I et østvendt gryteformet parti et stykke opp i lisiden like ovenfor fossen og fosseryksonen er det en rik løvblandingsskog/ krattskog/ gråorheggeskog med mange rikbarkstrær, herunder selje, rogn og hegg, og et frodig og artsrikt feltsjikt med bl.a. junkerbregne (sørlig art), hundekveke,



Figur 3: Detaljkart som viser beliggenhet til naturtypene nr 2 og 3 innefor influensområdet til Midtre prosjekt.



Fosse-eng i fosseyrone nedenfor fossen som ligger innenfor Midtre prosjekt.

kranskonvall, turt og skogstjerneblom. Rikbarkstrærne er generelt rike på epifytter, særlig lobarion-arter som lungenever *Lobaria pulmonaria*, skrubbenever *Lobaria scrobiculata*, vrenge-arter (*Nephroma* spp) og filtlav-arter (Pannariaceae) slik som vanlig blåfiltlav *Degelia plumbea* og stiftfiltlav *Parmeliella triptophylla*. Enkelte regionalt sjeldne, svakt sørlige lavarter opptrer spredt, herunder puteeglye *Collema fasciculare* og brun blæreglye *Collema nigrescens*.


Flere steder, men særlig nederst mot vassdraget er det store felt med treløse bergvegger, sildreflater rasmak og skrenter. En sidebekk fra Pelledalsfjellet i vest danner en dyp kløft som står rettvinklet på hovedvassdraget. Også tilknyttet denne kløfta er det store bergvegger og sildreflater. Kryptogamfloraen er godt utviklet, men utformingene er tilsynelatende ganske trivielle uten særlig mange kravfulle arter mtp krav til stabile mikroklimatiske forhold, substratkontinuitet eller mineraltilgang. Enkelte relativt kravfulle moser er likevel påvist. På konstant fuktige

bergvegger er relativt gode bestander av småstylte *Bazzania tricenata* påvist. Sagtvebladmose *Scapania umbrosa* og grokornflik *Lophozia ventricosa* har gode bestander på fuktige, delvis morkne granstokker helt nederst i kant av vassdraget. Lokaliteten fremviser stor variasjon i skogtyper og vegetasjonsutforminger fra urterike varmekjære løvkratt til fuktige skyggefulle kløfter og søkk med frodig mose og lavflora. Ingen rødlistearter, eller spesielt sjeldne arter er påvist, men en rekke mindre vanlige arter og regionalt uvanlige arter er påvist, og mangfoldet av arter er generelt høyt på tvers av organismegruppene. Samlet vurderes derfor lokaliteten som klart regionalt viktig (B-verdi).

5.3.3 Vikdalselva, fossen

Kommune:	Vefsn	Naturtype:	Fossesprøytsone
Dato feltreg.:	09.10.2006	Veg. sone:	MB
Registrant:	Jon T. Klepsland	Høydelag:	ca 100-130 moh.
Kartblad N50:	1926 I	Areal:	?? daa
UTM (sentral):	VP 1205 0628	Verdi:	A

Lokaliteten tilhører geografisk naturtype-objektet "Vikdalselva, midtre", men er gitt egen beskrivelse fordi "fosserøyksone" er skilt ut som egen naturtype i DN-håndbok 13. Naturtypelokaliteten karakteriseres av et 5-10 meter høyt fossefall som lander i en dyp vannkulp der elva rolig drenerer videre nedover. Naturkvalitetene er knyttet til den dramatiske topografien, den relativt stabile og store vannføringa og fosseyret som oppstår når vannet kaskaderer ned det høye fallet. Påvirkningen av fosseyret er størst midt i mot fossefallet, dvs på motsatt side av vannkulpen i forhold til hvor fossen lander. Det er en klar sonering i vegetasjonen avhengig av hvor kraftig fosseyret slår inn mot land. I den mest påvirkede sonen er det svaberg med ulik dekning av moser og små urter. Vegetasjonen går gradvis over i frodige staudeenger med vanlige skog-urter som mjødurt, sølvbunke, hvitbladtistel, marikåpe coll., vendelrot mm. Vegetasjonsutformingene på svaberget i fosseyret kan tilskrives vegetasjonstypen fosse-eng (Fremstad 1997). Fosse-eng er også oppført som en truet (VU) vegetasjonstype (Fremstad og Moen 2001). Bakenfor høystaudeengen står granskogen, og denne er i liten grad påvirket av fosseyret. I overgangen mellom staudeenga og granskogen er det



Seinvokst gran med fuktighetskrevede epifytt-samfunn i fosserøyksone.

imidlertid en sone med glissen seinvokst og buskformet gran som står i et jevnt fint yr i fra fossen. På disse grantrærne er det en rik epifyttflora av fuktighetskrevede arter, spesielt filtlavartene vanlig blåfiltlav *Degelia plumbea* og stiftfiltlav *Parmeliella triptophylla*. I tillegg er det mengder av rikt fertil filthinnelav *Leptogium saturninum*. Slike fuktighetskrevede epifyttiske samfunn på gran har en svært smal økologisk nisje og er således svært sårbare overfor endrede fysiske og klimatiske forhold. Enkelte svært sjeldne arter er nesten kun kjent fra slike små fosserøyksamfunn. Ingen svært sjeldne eller rødlistete arter ble dokumentert ved befaring, men erfaring tilsier at slike kan opp-


tre i svært små bestander og derfor være vanskelig å oppdage, selv etter grundig etter-søk. De spesielle økologiske forhold tilknyttet fossen her tilsier høy verdi selv om ikke sjeldne arter er påvist. Lokaliteten vurderes som nasjonalt viktig (A-verdi).

5.3.4 Vikdalselva, nedre

Kommune:	Hemnes	Naturtype:	"Lok med viktige bestander av ferskvannsfisk"
Dato feltreg.:	09.10.2006	Veg. sone:	MB
Registrant:	Jon T. Klepsland	Høydelag:	ca 0-60 moh.
Kartblad N50:	1926 I	Areal:	?? daa
UTM (sentral):	VP 1300 0840	Verdi:	B

Lokaliteten gjelder Vikdalsvassdraget fra dennes utløp i Vikdalsbukta og oppover så langt som sjørretten (*Salmo trutta*) vandrer i forbindelse med gytingen om høsten. Vik-


dalselva har en anadrom strekning på omtrent 700 meter (Lars Sæter pers medd.). Vikdalselva er kategorisert som et 5a vassdrag i DNS lakseregister (Direktoratet for Naturforvaltning 2007c). Koden forteller at vassdraget har en moderat/lite påvirket bestand av anadrom laksefisk og bestandet er vurdert som spesielt hensynskrevende. I følge Lars Sæter ved fylkesmannens miljøvernavdeling i Nordland så er sjørretbestandet i Vikdalsvassdraget klassifisert som hensynskrevende fordi populasjonen er liten (pers medd.). Lars Sæter har for øvrig gjennomført bonitering og ungfiskundersøkelser i vassdraget i 1989 og 1992 (Sæter 1991, 1995). I følge DN-håndbok 15 om ferskvann skal den anadrome strekningen av Vikdalelva betraktes som en lokalitet med viktig forekomst av ferskvannsfisk og lokaliteten skal på grunnlag av kategori i lakseregisteret gis regional verdi (B-verdi).



Figur 3: Beliggenhet til naturtype med anadrom sjørret innenfor influensområdet til Nedre prosjekt.

5.3.5 Pallan S

Kommune:	Hemnes	Naturtype:	Bjørkeskog med høgstauder
Dato feltreg.:	09.10.2006	Veg. sone:	NB
Registrant:	Jon T. Klepsland	Høydelag:	ca 200-380 moh.
Kartblad N50:	1926 I	Areal:	?? daa
UTM (sentral):	VP 1150 0475	Verdi:	A



Figur 4: Beliggenhet til naturtype nr 5, Pallan S.

Her inngår bl.a. lunge-never, skrubbenever, vrenge-arter (gryn-, glatt-, kyst-), kyståre-never og vanlig blåfiltlav. I tillegg forekommer de regionalt og til dels nasjonalt sjeldne lavene puteglye, olivenfiltlav, sølvnever og fossenever. Både olivenfiltlav og fossenever er rødlistete som sårbare (VU) i siste versjon av rødlista (Kålås et al. 2006). Lokalteten vurderes på bakgrunn av tilstand, størrelse og artsinventar som nasjonalt viktig (A-verdi).

Lokaliteten ligger noe på siden av det som er definert som influensområde, men er tatt med for å dokumentere naturverdiene her. Naturtypen er klassifisert som "bjørkeskog med høgstauder", men kunne nesten like godt vært ført til "gammel lauvskog". Lokaliteten er noe plukkhogstpåvirket, både i eldre og nyere tid. Det primære bruksområdet så langt er likevel skogbeite. Tre-sjiktet består av en sterkt ulikaldret løvblanding med mye selje og rogn foruten bjørk, og stedvis inngår også mye gråor og noe hegg. Alle treslag er representert med grove dimensjoner og noe død ved. Feltsjiktet er frodig og dominert av store bregner. Lokaliteten har en usedvanlig rik og variert epifyttisk lavflora. Særlig rogn har rike lobarion-samfunn.



Figur 5: Rik, fuktig og relativt gammel boreal løvblandingskog innenfor kjerne nr. 5, Pallan S.

5.4 Artsmangfold

5.4.1 Øvre prosjekt



Bildet illustrerer et artsrikt samfunn av Lobaria-arter med bl.a. den truede laven fossenever (VU) nede i høyre bildehjørne.

Prosjektet strekker seg fra nordboreal til alpin sone. Kraftstasjonen er tenkt plassert på breelvsedimenter i øvre del av en større sedimentasjonsflate med granskog og boreal løvskog. Deler av arealet nedstrøms kraftstasjonen er flompåvirket og har en fuktig utforming med en del gammel gråor. Gran er imidlertid nettopp hogd ut. Oppstrøms kraftstasjonen på vestsiden av vassdraget domineres arealet av boreal høystaudekog med rogn, selje, bjørk og noe gråor, samt intermediær- og middelsrik myrvegetasjon og kildesig. Ovenfor skoggrensa er det i hovedsak fattige lyngutforminger og til dels nakent berg med artsfattig epilittisk mangfold. I sørvest (på vestsiden av vassdraget) finnes imidlertid noen horisonter med marmor og tilknyttet disse er det rikere vegetasjonssamfunn med en rekke kalkkrevende karplanter og kryptogamer. Blant annet inngår her litt reinrose, noe setermjelt, tiriltunge, fleckmure, rødsildre, gulsildre, berggrubom, grønburkne og taggbregne.

Ett større fossefall opptrer omtrent midtveis mellom planlagt

plassering av kraftstasjon og inntaksdam. På tross av kraftig fosseyr og fremskutte bergparti midt i mot var vegetasjonssammensetningen vurdert som triviell og artsfattig. Dette skyldes trolig en kombinasjon av ulike ugunstige faktorer som høy beliggenhet (over tregrensa) og en relativt eksponert utforming som trolig gjør lokaliteten utsatt for naturlige variasjoner i vannføring, periodevis sterk solinnstråling/ tørke og direkte nedbør.

Den eldre boreale høystaudevegeterte løvblandingsskogen er beskrevet som egen naturtype (se full beskrivelse i kap. 5.3).

5.4.2 Midtre prosjekt

Prosjektet er lokalisert til øvre del av mellomboreal sone (evt nedre del av nordboreal). Granskog av ulike utforminger, særlig storbregnegranskog, kler lisidene langs vassdraget. Løvdominerte parti finnes også og disse er til dels rike på epifytter. Eksempelvis er

det i en østvendt gryte et stykke opp i lisiden rett vest for den planlagte plasseringen av kraftstasjonen en rik løvblandingsskog/ krattskog/ gråor-heggeskog med mange rikbarkstrær, herunder selje, rogn og hegg, og et frodig og artsrikt feltsjikt med bl.a. junkekbregne, hundekveke, kranskonvall, turt og skogstjerneblom.

Flere steder, men særlig nederst mot vassdraget er det store felt med treløse bergvegger, sildreflater rasmak og skrenter. En sidebekk fra Pelledalsfjellet i vest danner en dyp kløft som står rettvinklet på hovedvassdraget. Også tilknyttet denne kløfta er det store bergvegger og sildreflater. Kryptogamfloraen er godt utviklet, men utformingene er tilsynelatende ganske trivielle uten særlig mange kravfulle arter m.t.p. krav til stabile mikroklimatiske forhold, substratkontinuitet eller mineraltilgang. Enkelte relativt kravfulle moser er likevel påvist. På konstant fuktige bergvegger er relativt gode bestander av småstylte *Bazzania tricenata* påvist, og sagtvebladmose *Scapania umbrosa* og grokornflik *Lophozia ventricosa* har gode bestander på fuktige, delvis morkne granstokker helt nederst i kant av vassdraget. For øvrig er det rike epifyttiske (og dels epilittiske) lavsamfunn, særlig innen Lobarion-samfunnet i området, herunder lobarion-arter (pannariaceae) på gran i fossesprøytsone. En nærmere beskrivelse av artsmangfoldet er gitt i naturtypebeskrivelsene (se kap. 5.3).

5.4.3 Nedre prosjekt

Vegetasjonen langs vassdraget innefor influensområdet for nedre prosjekt er temmelig triviell. Små areal med flommarksskog (gråor-heggeskog) opptrer spredt langs vannstrengen, men bare relativt unge og svakt utviklete utforminger. For øvrig er det fattig lyngdominert barskog, ofte innplantet granskog eller bestander med vrifuru langs vassdraget. Vegetasjonen er lokalt rikere, dvs med innslag av stauder og andre middels mineralkrevende urter, langs vassdraget hvor det er en stadig tilførsel sedimenter, eller hvor det er et jevnt tilsig av grunnvann. Området er etter alt å dømme ikke viktig for sjeldne, hensynskrevende eller sårbare arter av kryptogamer eller karplanter (ingen slike er heller påvist ved befaring).

Vikdalselva har årviss oppgang av anadrom sjørret (Direktoratet for Naturforvaltning 2007c). Den anadrome strekningen er omtrent 700 meter (Lars Sæter pers medd.), og sjørreten går dermed et stykke forbi planlagt plassering av kraftstasjonen (se for øvrig naturtypebeskrivelsen i kap. 5.3). Lenger opp går elva i strie stryk og for det meste over steinbunn, noe som trolig representerer oppvandringshinder for ørreten.

Ingen interessante viltobservasjoner ble gjort under feltarbeidet. Forholdene ligger riktignok godt til rette for vassdragstilknyttede fugler slik som fossefall.

5.5 Inngrepsstatus

Inngrepsfrie naturområder defineres som områder som ligger mer enn en kilometer i luftlinje fra tyngre tekniske inngrep. Reduksjon og oppstyking av de inngrepsfrie områdene har foregått i rask takt etter den industrielle revolusjonen, og de viktigste årsakene er vegbygging og energiproduksjon. Områder uten tekniske inngrep blir sett på som en knapphetsressurs både i nasjonal og internasjonal sammenheng, og er en viktig del av den norske naturarven (Miljøstatus.no 2007). Vikdalen tilhører en region (Nord-Norge) hvor det fremdeles er forholdsvis store areal inngrepsfrie naturområder. Nærmere bestemt er fortsatt 66 % av landarealet i Nord-Norge klassifisert som inngrepsfritt (> 1 km fra nærmeste tyngre tekniske inngrep) (Miljøstatus.no 2007).

5.5.1 Øvre prosjekt

Inntaksdammen er tenkt lagt til kote ca 460 som ligger i overgangen mellom inngrepsfrie sone 2 (1-3 km fra tyngre tekniske inngrep) og inngrepsfri sone 1 (3-5 km fra tyngre

tekniske inngrep) etter de offisielle definisjonene gitt av DN (Direktoratet for naturforvaltning 2007b). Prosjektet ligger i sin helhet innefor inngrepsfri sone 2. En realisering av tiltaket vil medføre en relativt stor reduksjon i eksisterende INON-areal gjennom anlegg av inntaksdam, rørgate, kraftstasjon og anleggsvei. Nærmere bestemt vil nåværende sammenhengende INON-areal fra Sørgårdsfjellet i nordvest til Stortuva ved Mo-sjøen i øst nærmest splittes i to, og arealet tilhørende kategori inngrepsfri sone 1 vil nesten forsvinne (reduseres trolig 80-90 %) (Direktoratet for naturforvaltning 2007a).

5.5.2 Midtre prosjekt

Prosjektet ligger utenfor inngrepsfrie soner (INON-areal) og omtrent 1 km i luftlinje fra grensa mot inngrepsfri sone 2 (1-3 km fra tyngre tekniske inngrep). Dette skyldes at det allerede eksisterer en driftsvei langs vassdraget her som er definert som et tyngre teknisk inngrep. Tiltaket vil derfor i liten eller ingen grad redusere eksisterende INON-areal om det gjennomføres.

5.5.3 Nedre prosjekt

Prosjektet ligger utenfor inngrepsfrie soner (INON-areal) og omtrent 1 km i luftlinje fra grensa mot inngrepsfri sone 2 (1-3 km fra tyngre tekniske inngrep). Dette skyldes at det allerede eksisterer en driftsvei langs vassdraget her som er definert som et tyngre teknisk inngrep. I tillegg inngår flere stikkveier og i nedkant er det dyrket mark og bebyggelse. Tiltaket vil derfor ikke medføre reduksjon i eksisterende INON-areal om det gjennomføres.

5.6 Konklusjon – Verdi

Av temaene nevnt i metodedelene (se tabell 1 kap 3.2.) har vi data til å vurdere undersøkelsesområdet verdi for naturtyper, ferskvann, rødlistede arter, truede vegetasjonstyper, og betydning i forhold til INON-areal.

5.6.1 Øvre prosjekt

Innenfor influensområdet er det registrert og kartfestet én naturtype. Lokaliteten er ført til naturtypekategori "bjørkeskog med høgstauder" og er vurdert som lokalt viktig (C-verdi). Området har dermed, i følge NVEs veileder, liten verdi for deltema naturtyper. Vassdraget har ikke oppgang av anadrom fisk så langt at det berører influensområdet.

Det forekommer ingen truede vegetasjonstyper og det er ikke påvist truede eller sjeldne arter innefor influensområdet. Området er på dette grunnlag vurdert å ha liten verdi også for deltema rødlistearter, vegetasjonstyper og ferskvann.


Når det gjelder inngrepsfrie områder (INON-areal) så ligger tiltaket i sin helhet innenfor inngrepsfri sone 2. En realisering av prosjektet vil medføre kraftig reduksjon i eksisterende INON-areal tilhørende sone 1 og 2 i dette geografiske området. Tiltaket vil ikke berøre villmarkspreget områder (> 5 km fra tyngre tekniske inngrep). Området har derfor middels verdi for deltema INON-areal.

Samlet vurderes områdeverdien som middels stor for tema naturmiljø inkludert biologisk mangfold.

Verdivurdering		
Liten	Middels	Stor


5.6.2 Midtre prosjekt

To naturtyper er avgrenset innenfor influensområdet. Bekkekløften er vurdert som regionalt viktig, mens fosserøyksonen er vurdert som nasjonalt viktig. I følge NVEs veileder har da det aktuelle området stor verdi for deltema naturtyper. Fosse-eng med klassisk vegetasjonssonering og spesielle samfunnsutforminger av fuktighetskrevenne kryptogamer er påvist. Vegetasjonstypen fosse-eng er rødlistet som sårbar (VU) (Fremstad og Moen 2001). Ingen rødlistearter er påvist, men en rekke regionalt sjeldne eller uvanlige arter innen flere økologiske grupper finnes. Vassdraget har ikke anadrom laksefisk så langt opp, og det er ikke kjent til at vassdraget her har andre viktige kvaliteter knyttet til ferskvannsfauna. For deltema ferskvann og rødlistearter vurderes derfor området å ha liten verdi, mens for deltema truede vegetasjonstyper har området middels verdi. Området ligger i ikke-inngrepsfritt område, og en eventuell utbygging vil ikke redusere eksisterende INON-areal vesentlig. Området har derfor liten verdi for deltema INON. Samlet vurderes områdeverdien som stor for tema naturmiljø inkludert biologisk mangfold.



5.6.3 Nedre prosjekt

En ferskvannslokalitet er avgrenset som naturtype og gitt B-verdi grunnet forekomst av anadrom sjørret. Området har dermed middels verdi for deltema naturtyper. Det er ikke påvist andre naturtyper, viktige/ truede vegetasjonstyper eller sjeldne arter innenfor influensområdet. Området ligger utenfor eksisterende INON-areal og tiltak langs vassdraget vil heller ikke berøre INON-areal. På bakgrunn av forekomsten av anadrom laksefisk har influensområdet middels stor verdi for tema naturmiljø inkludert biologisk mangfold.



6 Omfang og betydning av tiltaket

6.1 Omfang og konsekvens

6.1.1 Øvre prosjekt

En eventuell realisering av prosjektplanene vil medføre inngrep i registrert naturtype i form av anlegg av driftsvei og rørgate. Anleggsaktiviteten vil berøre store areal direkte ved graving, sprengning og masseforflytninger. Vegetasjonen og skogutformingen har en lang utviklingshistorie bak seg som ikke kan restaureres tilbake til opprinnelig tilstand dersom jordprofilen forstyrres gjennom graving eller annen virksomhet. Slik planene foreligger vil inngrepene i naturtypen bli store; d.v.s. tiltaket vil ha stort negativt omfang på deltema naturtyper.

Redusert vannføring vil få betydning for sammensetningen av bunndyrfaunaen ettersom de fysiske forhold i elvestrengen endres. Bunndyr avhengige av hurtig rennende vann for fødeopptak og respirasjon vil gå tilbake eller forsvinne. Redusert vannføring etter anleggsfasen vil trolig medføre økt sedimentasjon (økt partikkelavsetning) i elvestrengen som følge av redusert skylle-effekt (transportkapasitet) når vannvolum og vannhastighet reduseres. Økt sedimentasjon og redusert vannføring vil redusere porøsiteten i bunnsubstratet og føre til økt begroing i elvestrengen. Dette vil over tid endre artssammensetningen og redusere den totale produksjonen av bunndyr (Saltveit 2006). Redusert vannføring og redusert bunndyrproduksjon vil også påvirke bestandene av vassdragstilknyttede fugler negativt. Økt menneskelig aktivitet i forbindelse med anlegget vil også virke negativt på fuglebestandene (Bakkestuen et al. 2005).

Uten grundigere undersøkelser eller bedre datagrunnlag enn det som foreligger er det vanskelig å vurdere hvor stor effekt vassdragsendringene vil ha på bunndyr- og fuglefaunaen. På generelt grunnlag vurderes tiltaket å ha middels stort negativt omfang for deltema ferskvann og deltema vilt.

Prosjektområdet ligger i inngrepsfri sone 2 (1-3 km fra tyngre tekniske inngrep). Prosjektrealisering vil medføre betydelig reduksjon i eksisterende INON-areal, både tilhørende sone 1 og 2. Tiltaket vil imidlertid ikke berøre villmarkspreget områder (> 5 km fra tyngre tekniske inngrep). Med støtte i tabell 2 vurderes derfor tiltaket å ville ha middels negativt omfang på INON-areal.

Samlet vurderes tiltaket å ha middels stor til stor negativ virkning på naturverdiene i området.

Omfang av tiltaket				
Stort neg.	Middels neg.	Lite / intet	Middels pos.	Stort pos.
----- ----- ----- -----				
▲				

Konsekvens

I totalvurderingen er prosjektområdets naturverdi (kap 5.6.1) og tiltakets omfang og virkning (kap 6.1.1) kombinert og vurdert under ett. Områdeverdien er vurdert som middels stor for tema naturmiljø, og prosjektplanene er vurdert å kunne ha middels til stort negativt omfang/ virkning på naturverdiene i området. På dette grunnlag er en realisering av tiltaket funnet å ha middels til stor negativ konsekvens/betydning for tema naturmiljø (- -) til (- - -).

6.1.2 Midtre prosjekt

En eventuell realisering av prosjektplanene vil medføre sterkt redusert vannføring i elvestrengen. Redusert vannføring vil påvirke de spesielle miljøbetingelsene i bekkekløften generelt og fossesprøytsone spesielt på en negativ måte. Særlig tilknyttet det relativt konstante yret fra fossen finnes sterkt spesialiserte samfunn med til dels sjeldne arter som er svært sårbare ovenfor endrete miljøbetingelser (se naturtypebeskrivelsen). Siden selv små endringer i fuktighetsregimet vil ha stor betydning for det nevnte artsamfunnet vurderes inngrepene til å ha en stor negativ betydning for naturtypen "fossesprøytsone" med tilhørende artsmangfold. Anleggsarbeidet i forbindelse med fremføringen av rørgata vil også påvirke bekkekløften og vegetasjonstypene i denne direkte. Anlegg av rørgata vil trolig medføre inngrep i bratt og rasutsatt terreng og aktiviteten i anleggsfasen og etableringen av rørgata vil trolig forstyrre den naturlige vegetasjonen på bergflater og i urer med permanent virkning. En fremføring krever muligens også rydding av skogvegetasjon langs traséen, noe som vil føre til økt solinnstråling og større luftgjennomstrømming og dermed endrede miljøforhold. Dette i kombinasjon med redusert vannføring i elva vil medføre ganske kraftig reduksjon og mindre stabilitet i luftfuktigheten med den effekt at vegetasjonsbildet endrer seg og de mest fuktighetskrevene artene forsvinner.

Som redegjort for i underkapittelet angående Øvre prosjekt så vil redusert vannføring også medføre negative effekter på bunndyrfauna og dermed også eventuelle vanntilknyttede fugl (eks fossefall). Tiltaket vil ikke ha (eller ubetydelig) innvirkning på INON-areal.

Samlet vurderes tiltaket å ha stor negativ virkning på naturverdiene i området.

Omfang av tiltaket				
Stort neg.	Middels neg.	Lite / intet	Middels pos.	Stort pos.
-----	-----	-----	-----	
▲				

Konsekvens

I totalvurderingen er prosjektområdets naturverdi (kap 5.6.2) og tiltakets omfang og virkning (kap 6.1.2) kombinert og vurdert under ett. Områdeverdien er vurdert som stor for tema naturmiljø, og prosjektplanene er vurdert å kunne ha stort negativt omfang/ virkning på naturverdiene i området. På dette grunnlag er en realisering av tiltaket funnet å ha stor negativ konsekvens/betydning for tema naturmiljø (- - -).

6.1.3 Nedre prosjekt

En eventuell realisering av prosjektplanene vil medføre sterkt redusert vannføring i elvestrengen. Dette vil med all sannsynlighet påvirke oppvandrings- og gytemulighetene for sjørørreten på en negativ måte. Hvor stor effekten vil bli avhenger av minstevassføringen og reguleringer i kritiske deler av året. Redusert vannføring i hele eller deler av året vil også påvirke ungfiskproduksjonen ved tap av habitat gjennom tørrlegging og redusert produksjon av bunndyr (føde). Redusert vannføring kan også medføre økt sedimentasjon som igjen fører til økt dødelighet hos egg og yngel (se Saltveit (2006)). I tillegg til dette vil anleggsfasen kunne medføre tilslamming av vassdraget gjennom graveaktivitet og økt erosjon fra berørte kantsoner. Om tiltaket gjennomføres som skissert i prosjektskissen vil effekten på sjørørretbestanden trolig være stor med negativt fortegn. Som redegjort for i underkapittelet angående Øvre prosjekt så vil redusert vannføring også medføre negative effekter på eventuelle vanntilknyttede fugler (eks. fossefall) pga redusert bunndyrproduksjon. Ingen spesielle naturverdier tilknyttet landarealet

er påvist, tiltaket vil derfor ikke ha noen virkning på deltema vegetasjonstyper, vilt eller rødlistearter. Tiltaket vil heller ikke berøre INON-areal.

Samlet vurderes tiltaket å ha stor negativ virkning på naturverdiene i området.

Omfang av tiltaket				
Stort neg.	Middels neg.	Lite / intet	Middels pos.	Stort pos.
----- ----- ----- -----				
▲				

Konsekvens

I totalvurderingen er prosjektområdets naturverdi (kap 5.6.2) og tiltakets omfang og virkning (kap 6.1.2) kombinert og vurdert under ett. Områdeverdien er vurdert som middels stor for tema naturmiljø, og prosjektplanene er vurdert å kunne ha stort negativt omfang/ virkning på naturverdiene i området. På dette grunnlag er en realisering av tiltaket funnet å ha middels til stor negativ konsekvens/betydning for tema naturmiljø (-) til (- - -).

6.2 Sammenligning med øvrige nedbørfelt/ andre nærliggende vassdrag

De spesielle miljøbetingelsene som oppstår i forbindelse med større fossefall i skogområder slik som de man finner innenfor influensområdet til Midtre prosjekt er sjeldne i et landskapsmessig perspektiv, både i regional og nasjonal sammenheng. Bekkekløfter og fossesprutsoner med tilsvarende rik epifyttvegetasjon er ikke tidligere påvist i Vefsn kommune, men særlig viktige bekkekløfter m.h.p. lavflora (og andre organismegrupper) finnes tilknyttet Vefsn-vassdraget i Grane og Hattfjelldal kommune (Hofton et al. 2006). En viktig forskjell er imidlertid at Vikdalsvassdraget ligger i en mer oseanisk klimasone med generelt bedre forhold for epifytter og andre fuktighetskrevede kryptogamer sammenlignet med dalførene lenger øst.

Med hensyn til bestander av anadrom laksefisk så er Vikdalselva ved siden av Aunelva eneste vassdrag i kommunen med moderat/ lite påvirket bestand av sjørørret (Direktoratet for Naturforvaltning 2007c). Andre vassdrag i kommunen med sjørørret har av ulike årsaker redusert bestand som effekt av redusert ungfishproduksjon (Direktoratet for Naturforvaltning 2007c).

6.3 Mulige avbøtende tiltak

6.3.1 Øvre prosjekt

For øvre prosjekt ligger de største konfliktene i forhold til naturverdier i plasseringen av rørgata. Slik planskissen foreligger, og ut fra rent anleggstekniske ønsker så vil tiltaket komme i sterk konflikt med eksisterende naturtype på vestsiden av vassdraget. Et konfliktdependende tiltak er å legge rørtraséen på østsiden av vassdraget hvor naturgrunnlaget er langt magrere og uten spesielle kvaliteter knyttet til gamle rikbarkstrær (rogn, selje, gråor). Eventuelt så bør rørgata føres ned langs elva på et tidligere tidspunkt enn det som fremgår av skissen til Sweco Grøner slik at det vesentligste av naturtypen forblir uberørt av inngrepet. For øvrig bør man legge flid i å begrense omfanget av inngrepet langs traséen, dvs unngå unødvendig mye gravearbeid, høye veiskjæringer og utrasing av løsmasser, særlig er dette viktig i de kalkrike blokkmarksområdene under Nordsidaksla (se for øvrig generelle miljøtilpasningstiltak for småkraftverk i Norconsult/NVE-veileder 2/2003 (Norconsult/NVE 2003)).

6.3.2 Midtre prosjekt

Om prosjektet skal realiseres er det fra et naturfaglig synspunkt fordelaktig om man holder seg til planene om fremføring av rørgatetrasé på østsiden av vassdraget. For å minimere konflikten forbundet med inngrep i eksisterende naturtypeobjekt (bekkekløften) er det viktig å begrense de fysiske inngrepene til et minimum. Ved montering av rørgata vil det derfor være best om dette kan skje ved bruk av kran el. lign. ovenfra i stedet for ved eksempel bruk av stillas el. lign. nedenfra. All form for hostinngrep innenfor avgrensede naturtyper bør unngås.

Av hensyn til de fuktighetskrevene lav- og mosesamfunnene kan et konfliktdependende tiltak være å sikre naturlig vannføring gjennom elveleiet i kritiske deler av året. Særlig kritiske perioder for disse samfunnene er sensommeren ettersom det da er fare for uttørking i finværsperioder med tørr og varm luft. Nærmere bestemt er månedene juli og august særlig kritiske. Det bør for øvrig settes en viss minstevassføring for resten av året som er tilstrekkelig for å opprettholde den nødvendige luftfuktighet for nevnte lav- og mosesamfunn, samt en viss bestand av bunndyr og dermed muligens tilstrekkelig næringsgrunnlag for ferskvannstilknyttet fugl. Hvor stor minstevassføringen bør være for ønsket effekt er ikke mulig å anslå, men den bør trolig være noe høyere enn den naturlige minstevassføringen i vassdraget gjennom det meste av året ettersom den naturlige vannføringen i kortere perioder kan være meget lav (Stig Vikdal pers. medd.)

6.3.3 Nedre prosjekt

Et konfliktreduserende tiltak med tanke på sjørret bestanden er å flytte kraftstasjonen opp vassdraget til ovenfor den delen av elvestrekningen sjørreten bruker i forbindelse med gyting, oppvekst og overvintring, d.v.s. ovenfor avgrenset naturtype. Et annet tiltak, men som ikke er like effektivt, er å sikre normal vanngjennomstrømming i elveleiet i kritiske deler av året, dvs gjennom hele perioden fra gytestart i oktober til yngelen er svømmedyktig ut i april-juni. Muligens er det tilstrekkelig å sikre en viss kontinuerlig minstevassføring i elvestrengen, eventuelt med økt vannføring i ørretens oppvandrings- og utvandringstid (okt-nov og april-mai), og i kombinasjon med fisketrapp (se Glover (2006)), men dette forslaget krever nærmere konsultasjon med fiskebiolog.

Særlig under anleggsfasen er det stor fare for tilførsel av slam og andre sedimenter ut i vassdraget. Om slikt skjer under høst og vinterhalvåret mellom gyting og eggklekking, så kan dette medføre stor eggdødelighet med sterkt redusert ungfiskproduksjon våren etter (Saltveit 2006). Et viktig konfliktdependende tiltak er derfor å legge flid i å minimalisere inngrep som fører til oppvirvling av bunnsedimenter eller lekkasje/ erosjon av jord og humus fra landarealene rundt vassdraget. Anleggsfasen bør i tillegg legges til sommerhalvåret når vannstanden er lavest og yngelen har klekt og forlatt bunnsedimentet. Tiltaket vil ikke ha store negative konsekvenser for andre naturverdier i området, men det vil ut fra et naturfaglig ståsted være tilrådelig å unngå inngrep i løvdominerte flommarksareal (dominert av gråor og evt. selje). Slike flommarksareal utgjør som regel bare en smal sone nærmest vassdraget og bør derfor lett kunne unngås.

7 Videre undersøkelser

Kunnskapsgrunnlaget for invertebrater inkludert bunndyrfauna og akvatiske pelager i vassdraget og brakkvannsfjorden regnes som mangelfull. Det samme gjelder områdets betydning for vilt og fugler, inkludert vassdragtilknyttede og klippehekkende arter. Registreringene av lav, moser og sopp gjennomført i løpet av feltdagene høsten 2006 har gitt et tilfredsstillende grunnlag for vurdering av naturverdi og konsekvenser av inngrep i definerte naturmiljø, men kartleggingen er langt fra uttømmende når det gjelder artsmangfold, forekomst og utbredelse av disse. Grundigere naturfaglige undersøkelser innen alle disse tema vil derfor sikkert medføre økt kunnskap om det biologiske mangfoldet i og langs Vikdalsvassdraget. Ved en eventuell realisering av kraftverkpro-

sje(ene) bør det settes i gang overvåkningsprogram for de mest sårbare samfunnene og artsforekomstene som vil bli berørt.

8 Sammenstilling

8.1 Øvre prosjekt

Generell beskrivelse av situasjon og egenskaper/kvaliteter		i) Vurdering av verdi
Det er registrert en lokalt viktig naturtype (C-verdi) innenfor influensområdet. Naturtypen dekker betydelige areal av influensområdet. Planområdet for tiltaket ligger i sin helhet innefor inngrepsfri sone 2 (1-3 km fra tyngre tekniske inngrep).		Liten Middels Stor ----- ----- ▲
Datagrunnlag:	Vurderinger av områdets verdi for naturmiljø inkludert biologisk mangfold er gjort på bakgrunn av databaseinformasjon (DN) og egen feltbe- faring oktober 2006.	Middels
ii) Beskrivelse og vurdering av mulige virkninger og konfliktpotensiale		iii) Samlet vurdering
Tiltaket omfatter inntaksdam ved kote 478 (evt. kote 470) og kraftstasjon på kote 221. Samlet rørlengde blir ca 1700-1800 m og fallhøyden ca 260 meter. Tiltaket medfører behov for ny anleggsvei inn til kraftstasjon samt vei langs rørgata til inntaksdam.	I korte trekk vil prosjektet medføre betydelig reduksjon av eksisterende INON-areal, både innenfor sone 1 og 2. Anleggsaktiviteten vil også berøre registrert naturtype i stor og negativ grad. Indirekte virkninger grunnet redusert vannføring er ikke kjent å påvirke spesielle naturverdier, men vil ha generelt negativ effekt på fauna og flora tilknyttet vannstrengen. Samlet er tiltaket vurdert å ha middels stor til stor negativ virkning på naturverdiene i området. Omfang: Stort neg. Middels neg. Lite/intet Middels pos. Stort pos. ----- ----- ----- ----- ▲	Stor negativ betydning (- - -)

8.2 Midtre prosjekt

Generell beskrivelse av situasjon og egenskaper/kvaliteter		i) Vurdering av verdi
Det er registrert to naturtyper innenfor influensområdet, én med regional verdi (B) og én med nasjonal verdi (A). Naturtypene dekker store deler av influensområdet.		Liten Middels Stor ----- ----- ▲
Datagrunnlag:	Vurderinger av områdets verdi for naturmiljø inkludert biologisk mangfold er gjort på bakgrunn av egen feltbefaring oktober 2006.	Middels
ii) Beskrivelse og vurdering av mulige virkninger og konfliktpotensiale		iii) Samlet vurdering
Tiltaket omfatter inntaksdam ved kote 179 og kraftstasjon på kote 101. Samlet rørlengde blir ca 700 m og fallhøyden 70-80 meter. Tiltaket medfører behov for opprusting av eksisterende traktorvei og anlegg av ny stikkvei til stasjonen. Rørgata vil delvis måtte sprenges ned, delvis boltes fast i bergvegg.	Prosjektrealisering vil medføre redusert vannføring, noe som vil påvirke de spesielle miljøbetingelsene i bekkekløften generelt og fossesprøytonen spesielt på en sterk og negativ måte. Anleggsvirksomheten vil trolig også forringe naturkvalitetene i bekkekløften direkte. Samlet er tiltaket vurdert å ha stor negativ virkning på naturverdiene i området. Omfang: Stort neg. Middels neg. Lite/intet Middels pos. Stort pos. ----- ----- ----- ----- ▲	Svært stor negativ betydning (- - -)

8.3 Nedre prosjekt


Generell beskrivelse av situasjon og egenskaper/kvaliteter		i) Vurdering av verdi
En naturtypelokalitet er avgrenset innenfor influensområdet. Naturtypen er avgrenset på grunnlag av forekomst av intakt og reproduserende anadrom sjørørret bestand. Naturtypen er begrenset til nedre del av vassdraget (og planområdet for prosjektet).		Liten Middels Stor ----- ----- ▲
Datagrunnlag: Vurderinger av områdets verdi for naturmiljø inkludert biologisk mangfold er gjort på bakgrunn av databaseinformasjon, personlige meddelelser (Lars Sæter) og egen feltbefaring oktober 2006.		Middels
ii) Beskrivelse og vurdering av mulige virkninger og konfliktpotensiale		iii) Samlet vurdering
Tiltaket omfatter inntaksdam ved kote 73 og kraftstasjon på kote 12. Samlet rørlengde blir ca 1100-1200 m og fallhøyden ca 60 meter. Tiltaket medfører anleggsvirkosomhet i forbindelse med etablering av inntaksdam og kraftstasjon, samt noe opprusting av eksisterende vei. Rørgata vil delvis måtte sprenges ned i berggrunnen.	Prosjektrealisering vil medføre redusert vannføring og dette er ventet å ha sterk negativ virkning på vannmiljøet generelt og den anadrome sjørørretbestanden spesielt. På dette grunnlag vurderes tiltaket å ha stor negativ virkning på naturverdiene i området. Omfang: Stort neg. Middels neg. Lite/intet Middels pos. Stort pos. ----- ----- ----- ----- ▲	Stor negativ betydning (- - -)

9 Referanser

- Bakkestuen, V., Bremnes, T., Erikstad, L., et al. 2005. Miljøeffekter av små kraftverk – erfaringer fra Telemark og Rogaland. 2005-3, s.80. URL:
- Brodtkorb, E. og Selboe, O.-K. 2007. Dokumentasjon av biologisk mangfold ved utbygging av småkraftverk (1-10 MW) - revidert utgave. NVE veileder 3/2007, s.18. URL: www.nve.no
- Direktoratet for Naturforvaltning. 1999. Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold. Direktoratet for Naturforvaltning, Trondheim.
- Direktoratet for Naturforvaltning. 2000. Kartlegging av ferskvannslokaliteter. Direktoratet for Naturforvaltning, Trondheim.
- Direktoratet for naturforvaltning. 2007a. Inngrepsfrie naturområder (INON).
- Direktoratet for naturforvaltning. 2007b. INON.
- Direktoratet for Naturforvaltning. 2007c. Lakseregisteret.
- Fremstad, E. 1997. Vegetasjonstyper i Norge. NINA, Trondheim.
- Fremstad, E. og Moen, A. 2001. Truete vegetasjonstyper i Norge. Rapport botanisk serie 2001-4, s.231. URL:
- Glover, B. m. f. 2006. Oversikt over avbøtende tiltak i Norge for sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF). s.30. URL:
- Hofton, T. H., Gaarder, G., Brandrud, T. E., et al. 2006. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer. Områdebeskrivelser for Nordland, delprosjekt 3-2005. NINA rapport (vedlegg) 151, s.258. URL: http://biolitt.homelinux.net/rapporter/omraadebeskrivelser_statskog-dp3-2005-nordland.pdf
- Kålås, J. A., Viken, Å. og Bakken, T. 2006. Norsk Rødliste 2006 - 2006 Norwegian Red List.
- Meteorologisk institutt. 2007. met.no.
- Miljøstatus.no. 2007. Miljøstatus i Norge.
- Moen, A. 1998. Nasjonalatlas for Norge. Vegetasjon. Statens Kartverk, Hønefoss.
- NGU. 2007a. www.ngu.no/kart/bg250.
- NGU. 2007b. www.ngu.no/kart/losmasse.
- Norconsult/NVE. 2003. Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk. s.130. URL:
- Saltveit, S. J. 2006. Økologiske forhold i vassdrag - konsekvenser av vannføringsendringer. NVE.
- Statens Vegvesen. 1995. Konsekvensanalyser. Del I. Prinsipper og metodegrunnlag. Håndbok 140, s.140. URL:

Muntlige kilder:

Lars Sæter, Fylkesmannens miljøvernavdeling i Nordland
Stig Vikdal, Grunneier
Geir Helge Kiplesund, Multiconsult AS



BioFokus er en ideell stiftelse som skal tilrettelegge informasjon om biologisk mangfold for beslutningstakere, samt formidle kunnskap innen fagfeltet bevaringsbiologi. BioFokus ønsker å bidra til en kunnskapsbasert forvaltning av norsk natur.

En kunnskapsbasert forvaltning forutsetter god dokumentasjon av de arealene som skal forvaltes. BioFokus legger derfor stor vekt på feltarbeid for å sikre oppdaterte og relevante data om botanikk, zoologi, økologi, samt avgrensning og verdisetting av områder.

Høy kompetanse er en forutsetning for å kunne registrere og presentere biologisk mangfold-data på en god måte. BioFokus sine medarbeidere er derfor godt skolert innenfor en rekke artsgrupper og har en bred økologisk forståelse for de ulike naturtypene som de arbeider med, det være seg skog, kulturlandskap eller ferskvann. Digitale verktøy som databaser, GIS og bilde-behandling er viktige redskaper i vårt arbeid for å anskueliggjøre naturverdier på en best mulig måte.

Stiftelse utgir en digital rapportserie som heter BioFokus-rapport, <http://biolitt.biofokus.no/rapporter/Litteratur.htm>

FJELLKRAFT AS

Tullins gate 2, 0166 Oslo • Postboks 7033, St. Olavs Plass, 0130 Oslo

Sentralbord: 23 35 45 50 • Telefaks: 23 35 45 60

Kontaktperson: Torbjørn Sneve • Mobil: 97 70 16 20 • e-post: torbjorn.sneve@nordkraft.no



Fjellkraft
– et selskap i Nordkraft-konsernet

