

Feltrapport - kartlegging av hekkende fugler i traséområdet for nettilknytning og atkomstvei for Hovatnet Aust vindkraftverk

Datainnsamling og feltarbeid

Traséområdene ble befart for hekkende fugler den 17.6 og 18.6.2013. Vær og observasjonsforholdene var meget gode begge dager, med svake vinder, god sikt og temperaturer på mellom 10 og 20 grader.

I tillegg til feltarbeidet er det gjennomført datainnsamling på fugl fra et potensielt influensområde som strekker inntil 2 km fra de aktuelle tiltaksområdene. Både skrevne og muntlige kilder er benyttet, og kjente nettsteder som Artskart og Naturbasen er sjekket opp. Det er også konferert opplysninger om lokaliteter unntatt offentligheten. For de deler av traséområdet som ligger inne i planområdet, refereres det til feltrapporten fra 2012.

Fenologisk var tidspunktet gunstig, da alle artene som hekker i området må antas å ha vært være på plass, samtidig som at sangaktiviteten var høy. Våren var sein i 2013, noe som tilsier at feltarbeidet ble gjennomført på et gunstig tidspunkt for å fange opp flest mulig av de forekomstene som er knyttet til området.

Kort områdebeskrivelse

Det aktuelle traséområdet omfatter ved siden av deler av planområdet, arealer som ligger i høydelag mellom 680 og 950 moh. Landskapet har relativt bølgete preg, med slake skogkledde og snaue høydedrag. Mellom høydedragene går det grunne, skogkledde dalganger, både vide og smale. Skog dekker store deler av området, med glissen furuskog og blandingsskog på høydedrag og løvskog i forsenkninger i landskapet (figur 1).

Berggrunnen i området er preget av harde og næringsfattige bergarter, noe som gir skrint jordsmonn og overveiende fattig vegetasjon.

Større og mindre vann preger spesielt forsenkningene i landskapet, men det er også en rekke småvann på høydedragene. Myr har relativt begrenset utbredelse i området, men naturtypen inngår spesielt i tilknytning til vann.

Brattberg finnes spredt i hele området, spesielt i tilknytning til dalgangene.

Området er en påvirket av inngrep, der anleggsveier, kraftledninger og reguleringsmagasin preger flere landskapsrom. Den menneskelige aktiviteten i området er overveiende lav, og er hovedsakelig knyttet til anleggsveiene og de få hyttene i området.



Figur 1. Landskapstrekk ved nordre delen av Hovatnet, sett mot vest.

Fugleliv

Nordlig trasé for nettilknytningen

Med grunnlag i feltundersøkelsene, er fuglelivet knyttet til traséområdet representativt for distriktet for årstiden. Området huser få arter som har overveiende lave bestandstettheter. Vanlig forekommende spurvefugler i området var løvsanger, trepiplerke, grønnsisik, gråsisik og bokfink. Førstnevnte art ble registrert i stort sett hele traséområdet, og var utvilsomt vanligste forekommende hekkeart i området. Andre spurvefugler som ble registrert var rødstjert, ringtrost, duetrost, måltrost, heipiplerke, svart hvit fluesnapper, svarttrost, munk og kjøttmeis. Ingen av disse artene er sjeldne i distriktet, men duetrost fremheves likevel som en relativt fåtallig art i denne delen av landet.

Andre fuglegrupper enn spurvefugler var knapt å se i området. En orrfugl hunn ble skremt opp i et potensielt hekkeområde like ved traseen den 17.6 (figur 1). Med grunnlag i sporfunn i området, må det antas at arten er vanlig forekommende i området. Lokaliteten ligger innenfor et større område som i Naturbasen er definert som viktig for arten.

En tårnfalk hunn i myting ble skremt opp i fjellvegg ved Buhei. Da fuglen ikke varslet, antas det at det ikke var hekking på stedet. Ingen andre rovfugler ble sett i området. Det foreligger ellers ingen kjente lokaliteter for hekkende rovfugl i traséområdet, men tiltaksområdet inngår i ett eller to hekketerritorier for kongeørn.

Ingen spetter ble registrert i området, men merk at det ble registrert et potensielt viktig hekkeområde for fuglegruppen (se nedenfor).

Ingen våtmarksfugler ble sett i området, og området vurderes å ha lavt potensial for hekkende andefugler og vadefugler. En art som strandsnipe, som er vanlig forekommende i denne delen av landet, ble ikke registrert ved noen av vannene i området. Det er ellers ingen kjente lokaliteter for hekkende lom i området.

Verdi: Ingen observasjoner av fugl i traséområdet fremheves som spesielle. Artsmangfold og tettheter er normalt for denne delen av fylket. Bortsett fra duetrost (middels verdi som hekkeområde), vurderes alle registrerte forekomster i felt til **liten verdi**. Traséområdet inngår i territoriet for hekkende kongeørn, noe som også vurderes til middels verdi.

Søndre traséområde

Basert på feltarbeidet og øvrig datainnsamling, huser også det søndre traséområdet kun ordinære forekomster av hekkende fugler. Ingen spesielle arter eller viktige funksjonsområder for fugl er/ble registrert i området. Ingen rovfugler, spetter, vadefugler eller andefugler ble registrert i området. Arten som *ble* registrert i traséområdet var løvsanger, bokfink, rødstjert, trepiplerke, kjøttmeis, rødvingetrost, måltrost, svarttrost og munk. Disse spurvefuglene er vanlig forekommende arter både lokalt og innenfor landsdelen.

Det ble ellers funnet flere spor av orrfugl i traséområdet, og arten er trolig en vanlig forekommende fugl i området.

Traséområdet ligger innenfor et hekketerritorium for kongeørn, men nærmeste kjente reirplasser flere kilometer fra traseen.

Verdi: Kun forekomster med liten verdi ble registrert i tilknytning til feltarbeidet.

Sammenstilling

Fuglelivet i traséområdet vurderes å ha stort sett **liten verdi**, og ingen spesielt viktige funksjonsområder er registrert. Tabell 1 og figur 2 gir en oversikt over forekomster av fugl i et samlet influensområde som vurderes å ha noe betydning.


Figur 2 viser ellers beliggenheten av dokumentert og potensielt viktige lokaliteter for fugler i det aktuelle traséområdet. Ospeskogen ved tjernet vurderes som en hekkeplass for spetter. Selv om det ikke ble registrert noen spettehull, vil trolig en nøye gjennomgang av alle ospene vise at der er spettehull her. Mange av ospene var store nok som hekkeplasser for små og mellomstore spetter, og flere andre osper vil bli store nok for dette i løpet av få år. Selv om ospeholt er vanlig forekommende i Setesdalen, er slike holt viktige som hekkeplasser for både spetter og andre hulerugere. I det aktuelle området ble det også registrert en annen huleruger; svart hvit fluesnapper. Lokaliteten gis middels verdi.

Tabell 1. Sammenstilling av viktige forekomster.

Art/gruppe	Rødliste	Forekomst	Verdi	Figur 1
Kongeørn		Traséområdet berører minst ett hekketerritorium Reirplasser kjent utenfor influensområdet.	Middels - stor	
Spetter		Et ospeholt ved ledningstraseen vurderes som godt egnet for hekkende spetter	Middels	x
Tårnfalk		En hunn i myting, trolig ikke hekkende, ble sett ved potensiell hekkeplass	Middels ¹	x
Duetrost		Minst 3 individer, også varslende, ble sett i et god egnet hekkeområde for denne arten	Middels	x
Lirype		I Naturbasen er det registrert et større område som dekker større deler av traseen		
Orrfugl		I Naturbasen er det registrert et større område som dekker større deler av traseen		

1) Dersom hekkeplass

2)



Figur 2. Lokalisering av viktige funn under feltarbeidet

Stavanger, 28.6. 2013

Toralf Tysse

Ecofact