

039/1 HAUGEVASSDRAGET

Fylke: Rogaland
Kommune: Tysvær

Nedbørfelt: 9 km²
Toppunkt: 126 moh.
Utløpspunkt: 0 moh.
Marin grense: ca 40 moh.
Kraftpotensial: -
Økonomiklasse: -
Naturgeogr. region: -

Objektet er foreslått av fylkesmannen i Rogaland som representativt kystvassdrag for nordlige deler av Rogaland. For en del fagområder mangler opplysninger.

Vassdraget ligger omtrent midt på halvøya mellom Førklandsfjorden og Førdesfjorden. Vassdraget består av tre greiner. En grein starter nordøst for Ådnafjell og renner via flere lange og smale vann ned i Vågavatn (26 moh.) og videre ut i nordenden av Haugevatn. Sør for Ådnafjell fra Ådnavatn (51 moh.) som er feltets største innsjø, starter den midtre greina. Denne bekken renner også via flere mindre tjern ut i Haugevatn. Fra nordsiden av Haukås, 131 moh., starter den søndre greina som via flere vann og tjern munnar i Vollavatn som igjen munnar ut i Haugevatn. Mellom greinene er det store myrområder.

Det småkuperte knauslandskapet har lite løsmasser. Berggrunnen består for det meste av kaledonske tungt forvitrelige gneiser.

Nedbørfeltet er meget lite berørt av tekniske inngrep. På vestsiden av Høyevatn, Vodlavatnet og Vågavatn, totalt mindre enn 1 km, er det landbruksdrift med tilhørende og spredt bosetting pluss en del hytter. En rekke steingjerder, klopper og murer er karakteristiske kulturminner og vitner om tidligere tiders virksomhet. I enkelte små partier er det plantet gran, men det forhindrer ikke at landskapet bærer preg av å være vestnorsk lynghei.

Vegetasjonen er i nordvest dominert av røsslynghei med gammel lyng, en del større eier og bjørkeskog. Sørøst for en skarp grense fra Narravika-Moldatjørn dominerer røsslyng bare på små grunnlendte, sørvendte arealer. Ellers er heia dominert av grasarter, for det meste blåtopp, selv om en stor del av arealet er fuktheim med rome. De mange myrene er fattigmyrer med litt bjørkeponerskog. Sør for Moldatjørn finnes små areal med blåbærdominert hei i bratt nordhelling.