

From: Paulsen Kåre <Kare.Paulsen@statkraft.com>
Sent: 12. juni 2017 10:02
To: Pettersen Vegard; Brodtkorb Eilif Magnus
Subject: VS: Rapport Suldalslågen
Attachments: NINA Kortrapport 75 GB 160517.pdf; 201000288-175 7091-2016
Botaniske undersøkelser i Suldalslågen 2016.pdf 1146929_1_1.pdf

Hei

Ref. spørsmål knyttet til begroing - og spyleflommer i Suldalslågen.

Rapport fra NIVA - 2016

- Moser var i 2016 det dominerende vegetasjonselementet, med midlere dekning mellom 23% og 72% på hovedstasjonene.
- Dekning av moser er i 2016 fortsatt høy på alle hovedstasjonene. På de øvre stasjonene ser det imidlertid ut til at det har vært en ca. 10 % reduksjon i mosedekningen siden 2001.
- Det er især høstutspylingen som har bidratt til å redusere mengden av moser i elva. I den første prøveperioden (1998-2000) virket det ikke som om mengde moser ble særlig redusert. Mosemengden var da like under 80% dekning i elva. I den andre perioden hvor man startet med høstspyling (2001-2003) synes det å bli en reduksjon av mosedekningen ned til under 70% dekning. Denne trenden har så fortsatt med en gradvis reduksjon av mosene fram til i 2016, slik at dekningen nå er mellom 50-60%.

Hilsen
Kåre